ანტიმედი 0,5% (Antimedi 0,5%)

საინექციო საშუალება, რომელიც სწრაფად ხსნის დამამშვიდებელი საშუალებების მოქმედებას და აბრუნებს ცხოველს ნორმალურ მდგომარეობაში.

სამიზნე სახეობა: გარეული ცხოველები, მცოხნავი ცხოველები, ღორი, ცხენი, ძაღლი, კატა

მწარმოებელი: ბიოტეკსი

პროდუქტის ტიპი: საინექციო საშუალება

პროდუქტის ფორმა: ხსნარი

იხილეთ მეტი:

შემადგენლობა: 1 მლ საინექციო ხსნარი შეიცავს

ატიპამეზოლი ჰიდროქლორიდი . . .5 მგ

ატიპამეზოლი ჰიდროქლორიდი არის α2-ანტაგონისტი, რომელიც ბლოკავს α2-რეცეპტორებს, ზრდის ნორადრენალინის გათავისუფლებას და ასტიმულირებს სიმფათეტიკურ ნერვულ სისტემას. ეს პროცესი ნეიტრალიზებს მედეტომიდინისა და დექსმედეტომიდინის ეფექტს, სწრაფად აღადგენს ცხოველის ნორმალურ მდგომარეობას, ხელს უწყობს გაღვიძებას და გადაადგილების უნარს. პრეპარატი სწრაფად შეიწოვება ინექციის შემდეგ, მაქსიმალური ეფექტი 10-15 წუთში ვლინდება და ორგანიზმიდან გამოიდევნება მეტაბოლიზმის გზით, ძირითადად შარდით.

გამოყენების ჩვენებები

პრეპარატი ანტიმედი გამოიყენება მედეტომიდინის ან დექსმედეტომიდინის მოქმედების ნეიტრალიზაციისთვის, რათა აღდგეს ცხოველის ნორმალური მდგომარეობა. ის სწრაფად ხსნის სედაციურ ეფექტს და აუმჯობესებს გულ-სისხლძარღვთა და სასუნთქი სისტემების მდგომარეობას.

გამოყენების წესი და დოზირება

ანტიმედი 0.5% შეჰყავთ კუნთებში (IM) ერთჯერადად, მედეტომიდინის ან დექსმედეტომიდინის ინექციიდან 15-60 წუთის განმავლობაში. ეფექტი ვლინდება 5-10 წუთში.

- გარეული და მცოხნავი ცხოველები, ღორი, ცხენი, ძაღლი: ანტიმედის დოზა (მკგ/კგ) 5-ჯერ აღემატება მედეტომიდინის დოზას. დოზა მლ-ში იგივეა, რაც მედეტომიდინის დოზა.
- კატა: ანტიმედის დოზა (მკგ/კგ) 2.5-ჯერ აღემატება მედეტომიდინის დოზას. მლ-ში დოზა მედეტომიდინის დოზის ნახევარია.

გამოშვების ფორმა: 10 მლ ყავისფერი მინის ფლაკონი, დახურული რეზინის საცობით, ალუმინის ბეჭდით და პოლიპროპილენის ფირფიტით.

შენიშვნა: საჭიროების შემთხვევაში, ინექცია შეიძლება განმეორდეს 10-15 წუთის შემდეგ.

შენახვის პირობები

ინახება არაუმეტეს 25°C ტემპერატურაზე, ორიგინალურ შეფუთვაში, მშრალ, სინათლისგან დაცულ ადგილას, საკვები პროდუქტებისგან განცალკევებით.

შეინახეთ ბავშვებისათვის მიუწვდომელ ადგილას.

ვარგისობის ვადა

2 წელი, ფლაკონის გახსნიდან ვარგისია არაუმეტეს 28 დღე.