

Аннотация

Биозан-500

Oxyclozanide, Oxfendazole

Лекарственная форма:

Таблетки для перорального применения в ветеринарии

Фармакотерапевтическая группа: Антигельминтное средство широкого спектра действия

ATCvet code: QP52AC52

Целевые виды: Крупный и мелкий рогатый скот

Состав

Одна таблетка содержит:

Оксиклозанид – 375 мг

Оксфендазол – 125 мг

Описание

Таблетки лилового оттенка, возможно с коричневым оттенком и вкраплениями.

На одной стороне имеется риска, на другой надпись «ВЮ».

Форма выпуска

300 таблеток в полиэтиленовом контейнере.

Фармакологические свойства

Оксиклозанид – антигельминтное средство группы салициланилидов широкого спектра действия, эффективно против незрелых и взрослых форм паразитов.

Применяется при фасциолезе, парамфистомозе, мониезиозе.

Механизм действия основан на нарушении окислительного фосфорилирования и снижении уровня АТФ, что вызывает гибель паразитов.

Всасывается медленно, терапевтическая концентрация в плазме достигается через 24 часа, выводится с фекалиями.

Оксфендазол – антигельминтное средство группы бензимидазолов, действует на нематод и цестод на всех стадиях развития.

Применяется при гемонхозе, остертагиозе, трихостронгилезе, нематодирозе, коопериозе, эзофагостомозе, буностомозе, диктиокаулезе, мониезиозе.

Механизм действия связан с блокированием фумаратредуктазы и нарушением энергетического обмена паразита. Выводится с мочой.

Показания

Комбинация оксиклозанида и оксфендазола обеспечивает полную дегельминтизацию животных.

Применяется у крупного рогатого скота, овец и коз при:

- Фасциолезе
 - Парамфистомозе
 - Мониезиозе
 - Диктиокаулезе
 - Гемонхозе
 - Остертагиозе
 - Трихостронгилезе
 - Нематодирозе
 - Коопериозе
 - Эзофагостомозе
 - Буностомозе
-

Способ применения и дозы

Перорально, индивидуально.

Фармакологическая доза:

Оксиклозанид – 10–15 мг/кг массы тела

Оксфендазол – 5–7,5 мг/кг массы тела

Практическая доза:

1 таблетка на 35 кг массы тела

При мониезиозе и парамфистомозе – 1 таблетка на 25 кг массы тела

Противопоказания

Не рекомендуется применять в первую треть беременности, а также у ослабленных и больных животных.

Побочные действия

При правильном применении побочные эффекты не отмечены.

Период ожидания

Мясо:

КРС – 28 дней

Овцы – 21 день

Молоко разрешено к употреблению через 5 дней (10 доек).

Условия хранения

Хранить в сухом, защищенном от света месте при температуре 15–25°C.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности: 3 года.

Производитель: Biotecs LLC, Грузия, Тбилиси, ул. Юмашева №8