

Ciperali SC

Альфа-циперметрин 10% SC

Инсектицид для бытового применения против тараканов, взрослых комаров и мух

Название пестицида: Ciperali SC

Форма препарата: Водная суспензия (SC)

Токсичность: Умеренно токсичен

Содержание действующего вещества: Альфа-циперметрин 10%

Механизм действия

Альфа-циперметрин — высокоактивный пиретроидный инсектицид, состоящий из высокоэффективного изомера циперметрина. Эффективно контролирует широкий спектр насекомых.

Показания к применению

Ciperali — пиретроидный инсектицид санитарного назначения, эффективен против комаров, мух, тараканов, муравьев и других ползающих вредителей.

Предназначен для применения в гостиницах, офисах, больницах, школах, питомниках растений, на предприятиях пищевой промышленности, в ресторанах и других закрытых помещениях и общественных местах.

Дозировка и применение

Внутреннее применение

Вредитель	Тип обработки	Разведение	Норма расхода
Мухи, комары	Обычное опрыскивание	1:50	1,5 мл/м ²
Тараканы, муравьи	Обычное опрыскивание	1:50	40 мл/м ²

Наружное применение

Вредитель	Тип обработки	Разведение	Норма расхода
Мухи, комары	Первичная обработка	1:100	0,7 л/100 м ²

Вредитель	Тип обработки	Разведение	Норма расхода
Тараканы, муравьи	Плановая обработка	1:200	0,7 л/100 м ²
Другие ползающие вредители	Плановая обработка	1:200	8–15 л/100 м ²

Меры предосторожности

- Не смешивать с щелочными веществами.
 - Токсичен для рыб и шелкопрядов; избегать загрязнения водоемов.
 - Соблюдать правила безопасности при работе с пестицидами.
 - Во время работы не принимать пищу и воду. После применения тщательно мыть руки.
 - Детям, беременным и кормящим женщинам запрещён контакт с препаратом.
 - При разливе: засыпать песком, землёй или опилками, собрать и захоронить.
 - Рекомендуется чередование с непиретроидными инсектицидами.
-

Симптомы отравления

Препарат воздействует на нервную систему.

Возможны зуд в месте контакта, головная боль, головокружение, тошнота, рвота, тремор, судороги, кома, шок.

Первая помощь

- При попадании на кожу — обработать тальком, затем промыть водой с мылом.
 - При попадании в глаза — промывать водой не менее 15 минут.
 - Специфического антидота нет, лечение симптоматическое.
 - При проглатывании — промывание желудка и срочная медицинская помощь.
-

Хранение и транспортировка

Хранить в прохладном, сухом, хорошо проветриваемом помещении.

Не хранить вместе с продуктами питания и кормами.

Беречь от влаги и солнечных лучей.

Хранить в недоступном для детей месте.

Условия хранения: При комнатной температуре, защищать от влаги, солнца и тепла.

Срок годности: 2 года.

Производитель: ООО «Biotecs», Грузия.