

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Пиротекс 7% + В12 + В6

Диминазена диацетурат

Раствор для инъекций. Для ветеринарного применения.

Состав

В 1 мл содержится: действующее вещество: диминазена диацетурат - 0,07 г.

Вспомогательные вещества: феназон; витамин В12; витамин В6; поливинилпирролидон; вода для инъекций до 1 мл.

Описание

Прозрачный красновато-оранжевый раствор с характерным запахом.

Фармакологические свойства

Диминазена диацетурат - антипротозойное средство, активное в отношении простейших, в том числе бабезий (возбудителей пироплазмоза: *Babesia bovis*, *Babesia ovis*, *Babesia caballi*, *Babesia equi*, *Babesia canis*), трипаносом (*Tr. congolese*, *Tr. vivax*, *Tr. brucei*) и тейлерий (*Theileria annulata*). Механизм его действия основан на нарушении аэробного гликолиза и синтеза ДНК у патогенных простейших, в том числе нарушении функций клеточной мембраны, повышении её проницаемости и разрушении клеточных структур, что приводит к гибели паразитов.

Феназон (антипирин) является стабилизатором диминазена, а также оказывает обезболивающее, жаропонижающее и противовоспалительное действие, сокращает продолжительность лихорадки.

Витамины В6 и В12 способствуют нормальному функционированию органов кроветворения и нервной системы.

После парентерального введения раствора диминазен достигает терапевтической концентрации в крови через 3-4 часа и сохраняет терапевтический уровень в течение 24 часов. Препарат накапливается преимущественно в почках и печени, выводится из организма с мочой, а в период лактации - частично с молоком.

По степени воздействия Пиротекс 7% + В12 + В6 относится к умеренно опасным веществам (3-й класс опасности). В рекомендуемых дозах не оказывает сенсibilизирующего, эмбриотоксического и тератогенного действия.

Показания к применению

Пиротекс 7% + В12 + В6 применяют для лечения и профилактики кровепаразитарных заболеваний крупного рогатого скота, овец, коз, лошадей, верблюдов и собак (трипаносомоз, пироплазмоз, бабезиоз, гемоспоридиоз, франсаиеллёз, тейлериоз, нутталлиоз лошадей), а также смешанных инвазий (пироплазмоз и франсаиеллёз).

Побочные действия

При применении в рекомендуемых дозах препарат не вызывает побочных действий, не оказывает местнораздражающего и аллергического действия.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к любому компоненту препарата.

Целевые виды животных

Крупный и мелкий рогатый скот, верблюды, лошади, собаки.

Способ применения и дозировка

Препарат вводят однократно глубоко внутримышечно.

Крупному рогатому скоту, овцам, козам, лошадям, верблюдам: для лечения - 1 мл на 20 кг массы тела; для профилактики - 1 мл на 40 кг массы тела. При необходимости лечебную дозу можно повторить через 24 часа.

При нагоне, вызванной трипаносомами, препарат применяют в двойной дозе.

Для лечения протозойных заболеваний собак - 1 мл на 10 кг массы тела.

Особые предупреждения

Особые предупреждения для каждого целевого вида: из-за возможной болевой реакции рассчитанный объём раствора, вводимый в одно место, не должен превышать 10 мл для крупных животных и 2,5 мл для мелких животных. При большем объёме препарат вводят в несколько мест. При применении препарата возможна местная реакция в виде гиперемии или болезненной припухлости в месте инъекции, которая самостоятельно исчезает в течение нескольких дней.

У собак возможны судороги, атаксия, рвота и мышечный тремор.

Особые меры предосторожности при применении у целевых видов

Для лечения протозойных заболеваний собак рекомендуемую дозу необходимо разделить на два введения с интервалом 1-2 часа. Перед введением препарата также рекомендуется парентеральное введение антигистаминного средства.

Больных животных следует содержать в спокойной обстановке и дополнительно назначать симптоматические средства (сердечные средства, антигистаминные препараты, слабительные, витамины, микроэлементы).

При лечении животных с острой формой заболевания вследствие массовой гибели кровепаразитов возможно развитие интоксикации, нарушения функции печени и сердечно-сосудистой системы. В этих случаях необходимо проведение интенсивной терапии, включая внутривенное введение растворов электролитов и гепатопротекторов.

Особые меры предосторожности для лица, применяющего ветеринарный препарат

При работе с препаратом следует соблюдать общие правила личной гигиены и меры безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными средствами. Лицам с повышенной чувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с ним. Во время работы запрещается есть, пить и курить. После окончания работы вымыть руки тёплой водой с мылом. Пустые флаконы нельзя использовать в бытовых целях; их следует утилизировать с бытовыми отходами.

При случайном попадании препарата на кожу или слизистые оболочки глаз промыть их большим количеством проточной воды. При появлении аллергических реакций или

случайном попадании препарата в организм человека немедленно обратиться в медицинское учреждение (иметь при себе инструкцию по применению или этикетку).

Беременность и лактация

Беременным и лактирующим животным, а также щенкам препарат назначают с осторожностью, под непосредственным наблюдением ветеринарного врача, на основании оценки соотношения пользы и риска.

Передозировка

При передозировке у животных могут наблюдаться нервные симптомы: брадикардия, учащённое дыхание, анорексия, тремор. В этом случае необходимо провести симптоматическое лечение.

Взаимодействие

Запрещается применение препарата совместно с другими антипротозойными средствами.

Период ожидания

Убой животных на мясо допускается не ранее чем через 21 день после последнего применения препарата. Период ожидания для молока - 3 дня.

Мясо животных, вынужденно убитых до окончания периода ожидания, используют для изготовления мясокостной муки. Препарат абсолютно безопасен для обслуживающего персонала.

Условия хранения

Хранить в сухом, защищённом от света месте при температуре не выше 25 °С.

Срок годности

1 год.

Форма выпуска

Раствор для инъекций по 100 мл, 50 мл и 24 мл во флаконах из янтарного стекла типа III, герметично закрытых серой бромбутиловой резиновой пробкой, алюминиевым колпачком и пластиковым съёмным колпачком для контроля первого вскрытия.

Фармакотерапевтическая группа

Противопаразитарное, антипротозойное средство. Код ATCvet: QP51DF01 - диминазен.

Хранить в недоступном для детей месте.

Только для лечения животных.

Отпускается по назначению ветеринарного врача.

Производитель

ООО «Biotecs», Грузия, Тбилиси, ул. Iumashevi, № 8.