

Ратекс (Ratex)

Дератизационное средство против грызунов
Компания-производитель: ООО «Биотекс», Грузия

I. Общие сведения

1. Дератизационное (родентицидное) средство Ратекс (Ratex) представляет собой раствор для приготовления приманок, используемых для уничтожения грызунов.
2. **Состав:** бромадиолон 0,5%
3. **Форма выпуска:** в флаконах по 20 мл, 100 мл и 1 л. Возможна упаковка и в иных объемах. Каждая из единиц упаковки снабжена маркировкой, указаны наименование компании-производителя, ее адрес, торговый знак, торговое наименование, состав, количество в упаковке, назначение и способ употребления, номер серии, время изготовления, срок годности (месяц, год), условия хранения.
Хранить в сухом, прохладном месте при температуре от 0°C до 18°C.
Хранить в местах, защищенных от детей
Срок годности – 12 месяцев с даты изготовления

II. Биологические свойства

4. Препарат представляет собой антикоагулянтное средство для борьбы с грызунами (мыши, крысы, полевые мыши и др.). Раскидывать в виде приманок по норам для создания ядовитого покрытия.

III. Способ употребления и дозы

5. 20 мл раствора Ратекса смешать с 0.5 кг приманки (пшеница, картофельная мука, мясо и др.), можно добавить сахар или сухое молоко. Тщательно смешать. Приготовленную приманку разделить на несколько частей, разложить в разных местах с прикрытием, используя приманочные ящики, коробки и пр. подходящей вместимости.
 - В закрытых помещениях: для домашних мышей 10-25 г/2-15 м² площади; для черных и серых крыс 50-100 г/15-20 м² площади в зависимости от количества грызунов. Порции приманок для мышей раскладывают чаще, чем для крыс.
 - На сельскохозяйственных угодьях и посевных участках: для полевых мышей 100 г/300 м² площади.

Разложенные приманки осмотреть через 1-2 дня, а затем с недельными интервалами. Порции, съеденные полностью либо частично, восполнить. Процедуру повторять до уничтожения грызунов.

IV. Личная профилактика

6. Во время работы соблюдать общие правила личной гигиены и безопасности, предусмотренные законодательством и методическими указаниями по работе с дератизационными средствами.
 - Для личной безопасности использовать спецодежду, перчатки, защитные очки, пинцет либо полиэтиленовую ложку.
 - Не допускать попадания средства на слизистые оболочки или кожу. При случайном контакте смыть большим количеством воды
 - При работе с препаратом запрещается курить и принимать пищу.
 - После завершения работы следует выстирать использованную одежду, тщательно вымыть руки теплой водой с мылом.

- При случайном отравлении Ратексом следует немедленно прекратить работу. При проглатывании вызвать рвоту, давать пить активированный уголь и незамедлительно обратиться к врачу.