

Инструкция по применению

Настойка чемерицы

Tincturae Veratri

Лекарственная форма

Раствор для перорального и наружного применения, только для ветеринарного использования.

Фармакотерапевтическая группа: Средство, действующее на пищеварительную систему. Противозктопаразитарное средство.

Целевой вид: Крупный рогатый скот, овцы, козы, собаки.

Состав

1 мл раствора содержит:

- Действующее вещество: Экстракт корней чемерицы – 100 мг

Вспомогательные вещества:

- Спирт этиловый 70° – до 1 мл
-

Описание

Прозрачный раствор жёлтого или коричневатого-жёлтого цвета со специфическим запахом.

Форма выпуска

10 мл во флаконе из коричневого стекла и 250 мл в полиэтиленовом флаконе.

Фармакологические свойства

Препарат получен из корневищ белой чемерицы. Содержит алкалоиды (протовератрин и нервин), а также смолы, сахара, крахмал и дубильные вещества.

При пероральном применении алкалоиды раздражают слизистую оболочку и рефлекторно усиливают моторику и секрецию желез преджелудков у жвачных животных, что вызывает отрыжку и жвачку. У собак и свиней вызывает рвоту.

При наружном применении обладает выраженным эктопаразитарным действием. Активен против вшей, блох, власоедов и клещей на всех стадиях развития.

Механизм действия заключается в блокировании передачи нервных импульсов, что приводит к нарушению координации движений, параличу и гибели эктопаразитов.

Показания к применению

У жвачных животных (КРС, овцы, козы) применяется как руминаторное средство для восстановления жвачки при заболеваниях преджелудков (хроническая атония, тимпания, переполнение рубца кормом) и парезе.

Собакам назначают как рвотное средство и средство против эктопаразитов для лечения и профилактики.

Способ применения и дозировка

Внутреннее применение

Применяют однократно перорально с питьевой водой в следующих дозах:

- КРС: 2–2,5 мл на 100 кг массы тела или 5–12 мл на животное.
- Овцы и козы: 0,7–0,8 мл на 10 кг массы тела или 2–4 мл на животное.

При хронической тимпании рубца указанную дозу делят на три части и дают с интервалом 3 часа.

- Собаки: 0,5–2 мл на животное 1–2 раза в день до выздоровления.
-

Наружное применение

Используется для лечения и профилактики эктопаразитов (блох, вшей, власоедов, клещей).

Настойку предварительно разводят в нехлорированной воде (1:1), распыляют на спину животного в местах скопления паразитов. Через 15–20 минут обработанное место тщательно вычёсывают и моют мыльной водой (или шампунем). Повторную обработку проводят через 8–10 дней.

Предупреждение

При наружном применении не допускать слизывания препарата.

Побочные действия

При соблюдении доз и инструкции побочные эффекты не наблюдаются.

При передозировке возможна тяжёлая интоксикация. В таких случаях вводят 1% раствор сульфата атропина в рекомендуемых дозах.

Противопоказания

Не назначают лошадям и беременным коровам.

Период ожидания

Продукты животного происхождения (мясо, молоко): 0 дней.

Условия хранения

Хранить в сухом, защищённом от света месте при температуре 18–22°C.

Срок годности

2 года.

Производитель

Biotecs, Грузия

г. Тбилиси, ул. Iumashevi, №8