

Лекарственная форма

Порошок для перорального применения в ветеринарии.

Фармакотерапевтическая группа: Системное противомикробное, антибактериальное средство.

ATCvet Code: QJ01EW03

Целевой вид: Бройлерные цыплята, телята, свиньи, кролики.

---

Состав

1 г порошка содержит:

- Сульфадимидин натрия – 187,5 мг
- Триметоприм – 37,5 мг
- Колистина сульфат – 22 мг

Вспомогательное вещество:

- Лактоза – 753 мг
- 

Описание

Однородный белый порошок.

---

Форма выпуска

250 г в серебристом полиэтиленовом пакете.

---

Фармакологические свойства

Фармакологические свойства Тримакола обусловлены противомикробным действием входящих в его состав компонентов (комбинация сульфадимидина, триметоприма и колистина сульфата).

Комбинация обладает выраженным синергическим эффектом и бактерицидным действием в отношении большинства грамположительных и грамотрицательных кокков, включая:

*Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Klebsiella pneumoniae*, *Salmonella spp.*, *Shigella spp.*, *Aerobacter aerogenes*, *Bordetella spp.*, *Clostridia spp.*, *Corynebacterium spp.*, *Haemophilus spp.*, *Pasteurella spp.*, *Proteus spp.*, *Bacteroides spp.*, *Erysipelothrix spp.*, *Staphylococcus spp.*, *Streptococcidae spp.* и др.

---

### Показания к применению

Тримакол применяют для лечения инфекционных заболеваний бактериальной природы у бройлерных цыплят, телят, свиней и кроликов.

Препарат эффективен против инфекций, вызванных микроорганизмами, чувствительными к сульфадимидину, триметоприму и колистину сульфату, включая инфекции дыхательных путей, желудочно-кишечного тракта и мочеполовой системы, а также вторичные бактериальные инфекции (после вирусных заболеваний).

#### Бройлерные цыплята:

Хронические респираторные заболевания, колибактериоз, сальмонеллёз, гистомоноз, кокцидиоз, трихомоноз.

#### Телята:

Бронхопневмония, гастроэнтерит, колибактериоз, сальмонеллёз, некробактериоз, омфалофлебит, кокцидиоз, трихомоноз.

#### Свиньи:

Бронхопневмония, бактериальный энтерит, колибактериоз, колиэнтеротоксемия, сальмонеллёз, дизентерия бактериальной и протозойной этиологии, балантидиоз.

#### Кролики:

Кокцидиоз и инфекционный энтерит (вызванный грамотрицательными бактериями), другие бактериальные инфекционные заболевания.

---

### Способ применения и дозы

Применяют перорально телятам, свиньям, кроликам и цыплятам в терапевтической дозе:

- 1 г на 10 кг массы тела, или
- 1 г на 1–2 л питьевой воды, или
- 0,5–1 г на 1 кг корма.

Курс лечения — 5–7 дней.

---

#### Побочные действия

Не известны.

---

#### Противопоказания

При повышенной чувствительности к сульфаниламидам и триметоприму возможно развитие нарушений функции почек, печени, кроветворения, полиневрита.

---

#### Несовместимость с другими препаратами

Не совместим с другими антибиотиками и кокцидиостатиками.

Не применять совместно с гексаметилентетрамином (метенамином).

---

#### Период ожидания

Мясо животных допускается к употреблению в пищу через 15 дней после последнего применения препарата.

---

#### Условия хранения

Хранить в сухом, защищённом от света месте при температуре не выше 25°C.

Хранить в недоступном для детей месте.

---

Срок годности

2 года.

---

Производитель

ООО «Biotecs», Грузия.