

Аннотация

Биозан 990 Форте

Oxyclozanide, Oxfendazole, Ivermectin

Лекарственная форма:

Таблетки для перорального применения. Для ветеринарного использования.

Фармакотерапевтическая группа: Антигельминтное средство

АТСvet код: QP54AA51 ivermectin, combinations

Целевые животные: Крупный и мелкий рогатый скот

Состав

Одна таблетка содержит:

- Оксиклозанид – 680 мг
- Оксфендазол – 300 мг
- Ивермектин – 10 мг

Форма выпуска:

300 таблеток в полиэтиленовом флаконе.

Описание:

Таблетки сиреневого оттенка, возможно наличие коричневатого оттенка и вкраплений. С одной стороны имеется риска, с другой — надпись «ВІО».

Фармакологические свойства

Препарат обладает широким спектром антигельминтного действия. Комбинация оксиклозанида, оксфендазола и ивермектина обеспечивает полную дегельминтизацию крупного и мелкого рогатого скота против нематод, трематод и цестод.

Оксиклозанид (группа салициланилидов) эффективен против молодых и взрослых форм паразитов. Применяется для профилактики и лечения фасциолёза, парамфистомоза и мониезиоза. Механизм действия основан на снижении уровня АТФ и нарушении окислительного фосфорилирования, что приводит к гибели паразитов. Медленно всасывается, терапевтическая концентрация достигается через 24 часа, выводится с фекалиями.

Оксфендазол (группа бензимидазолов) действует на нематод и цестод на всех стадиях развития. Блокирует фумаратредуктазу и нарушает энергетический обмен паразитов. Выводится с мочой.

Ивермектин (группа макроциклических лактонов) обладает широким противопаразитарным действием против нематод, цестод и членистоногих. Усиливает высвобождение ГАМК, нарушая передачу нервных импульсов, вызывая паралич и гибель паразитов. Быстро всасывается, пик концентрации в плазме достигается через 4 часа. Период полувыведения — 1,6–1,8 суток. Выводится с мочой и желчью.

Показания

Применяется для лечения крупного и мелкого рогатого скота при: Фасциолёзе, дикроцелиозе, парамфистомозе, мониезиозе, авителлинозе, диктиокаулёзе, гемонхозе, остертагиозе, трихостронгилиозе, нематодирозе, коопериозе, эзофагостомозе, буностомозе и эстрозе.

Способ применения и дозы

Препарат применяют перорально, индивидуально.

Фармакологическая доза:

- Оксиклозанид: 10–15 мг/кг массы тела
- Оксфендазол: 5–7,5 мг/кг массы тела
- Ивермектин: 0,2–0,4 мг/кг массы тела

Практическая доза:

- При фасциолёзе, дикроцелиозе, диктиокаулёзе, гемонхозе, остертагиозе, трихостронгилиозе, нематодирозе, коопериозе, эзофагостомозе, буностомозе, эстрозе — 1 таблетка на 65 кг массы тела.
 - При мониезиозе, авителлинозе, парамфистомозе — 1 таблетка на 55 кг массы тела.
-

Противопоказания

Не рекомендуется применять в первом триместре беременности, а также ослабленным и больным животным.

Побочные действия

При правильной дозировке побочные эффекты не отмечаются.

Период ожидания

Убой на мясо:

- КРС — через 28 дней
- Овцы и козы — через 21 день

Молоко пригодно к употреблению через 5 дней (10 доек) после последнего применения.

Условия хранения

Хранить в сухом, защищённом от света месте при температуре 15–25°C.
Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности: 3 года.