

## Аннотация

Норсульфазол-натрий (Norsulfazol–natrium)

Sulfathiazole

Порошок для перорального применения, используется в ветеринарии

---

## Состав

1 г порошка содержит:

Сульфатиазол натрия – 998 мг

---

## Описание

Белый или слегка желтоватый порошок без запаха.

---

## Фармакологические свойства

Норсульфазол натрия обладает выраженной антимикробной активностью против многих грамположительных и грамотрицательных бактерий: *Streptococcus*, *Meningococcus*, *Salmonella*, *E.coli*, *Pasteurella* и др.

Препарат легко всасывается из желудочно-кишечного тракта и быстро выводится из организма. Терапевтическая концентрация в крови сохраняется 6–12 часов. Выводится преимущественно с мочой.

---

## Целевые виды животных

Крупный рогатый скот, телята, мелкий рогатый скот, лошади, свиньи, кролики, птица.

---

## Показания

Катаральная бронхопневмония, плевриты, стрептококковый и стафилококковый сепсис, гастроэнтериты, диплококковая септицемия и другие бактериальные инфекции, вызванные чувствительными к норсульфазолу микроорганизмами.

---

### Способ применения и дозы

Применяется перорально, растворяя в питьевой воде, индивидуально или групповым методом (обеспечить равномерное распределение в корме).

Кролики (кокцидиоз):

1-й день – 0,4 г/кг массы тела (0,5–1% раствор) 2 раза в сутки или 0,2 г/кг с увлажнённым кормом.

Следующие 4 дня – 0,1 г/кг.

Телята:

0,02–0,05 г/кг массы тела.

Начальная доза – двойная от рекомендуемой.

Курс 3–4 дня.

В расчёте на одно животное:

- Лошади и КРС – 10–25 г
- Свиньи, овцы, козы – 2–5 г
- Птица – 0,5 г 2–3 раза в день (начальная доза двойная)

Для усиления терапевтического эффекта рекомендуется сочетание с препаратами йода.

---

### Противопоказания

Нефриты, нефрозы, заболевания кроветворной системы.

---

### Побочные действия

Как правило, не наблюдаются. Редко: рвота, диарея.

При длительном применении возможны дерматиты, нарушения со стороны нервной и сердечно-сосудистой системы.

---

### Особые указания

При отсутствии улучшения через 3 дня лечение прекратить.  
Обеспечить достаточное потребление воды.  
Обработанных животных содержать отдельно, регулярно очищать клетки.

---

#### Меры предосторожности

Возможна сенсibilизация и контактный дерматит. Избегать контакта с кожей.  
Использовать перчатки и респиратор.

---

#### Взаимодействие

Не смешивать с другими ветеринарными препаратами, особенно с антибактериальными средствами, кокцидиостатиками, местными анестетиками и производными пара-аминобензойной кислоты.

---

#### Период ожидания

Мясо – 5 суток

Молоко – 2 суток

Не применять у птицы, яйца которой предназначены для употребления в пищу человеком.

---

#### Условия хранения

Хранить в сухом, защищённом от света месте при комнатной температуре.

Срок годности: 3 года

---

Фармакотерапевтическая группа: Антибактериальное средство системного действия  
ATCvet код: QJ01EQ07

Хранить в недоступном для детей месте.

Только для ветеринарного применения.

Отпускается по назначению ветеринарного врача.

Производитель: ООО «Биотекс», ул. Юмашева 8, Тбилиси, Грузия.