

Бифлокс 10% (Biflox 10%)

Энрофлоксацин

Лекарственная форма

Раствор для перорального применения, для ветеринарного использования.

Фармакотерапевтическая группа

Системное антимикробное средство, антибиотик группы фторхинолонов.

АТСvet код: QJ01MA90

Описание

Прозрачный раствор слегка желтоватого цвета, без видимых частиц.

Виды животных

Домашняя птица, поросята.

Состав

1 мл раствора содержит:

- **Действующее вещество: энрофлоксацин 100 мг**
- **Вспомогательные вещества: гидроксид калия, бензиловый спирт, очищенная вода**

Форма выпуска

Ампулы по 1 мл;

Флакон полиэтиленовый 100 мл;

Бутылка полиэтиленовая 1 л.

Фармакологические свойства

Энрофлоксацин — антибиотик группы фторхинолонов с широким спектром антибактериального действия. Активен в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий:

Escherichia coli, Haemophilus spp., Klebsiella spp., Pasteurella spp., Pseudomonas spp., Bordetella spp., Campylobacter spp., Erysipelothrix spp., Corynebacterium spp., Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Actinobacillus spp., Clostridium spp., Bacteroides spp., Chlamydia spp., Rickettsia spp., Mycoplasma spp.

Механизм действия основан на ингибировании фермента ДНК-гиразы, что нарушает репликацию бактериальной ДНК.

Показания

Применяется для лечения домашней птицы (бройлеры, ремонтный молодняк, индейки, гуси, утки) и поросят при:

- Колибактериозе
- Сальмонеллёзе
- Пастереллёзе
- Стрептококкозе
- Микоплазмозе
- Некротическом энтерите (моно- и смешанные инфекции)
- Инфекциях, вызванных *Pseudomonas aeruginosa*, *Staphylococcus*, *Coryza*, *Pasteurella*, *Erysipelothrix*

Также применяется при смешанных инфекционных заболеваниях и вторичных бактериальных осложнениях вирусных болезней.

Способ применения и дозы

Применяется перорально (с питьевой водой) 1 раз в сутки в течение 3–5 дней.

Поросята:

0,5 мл на 10 кг массы тела в течение 3 дней.

Птица:

0,1 мл/кг массы тела

или

500 мл на 1000 л питьевой воды в течение 3 дней.

При сальмонеллёзе, смешанных инфекциях и хронических заболеваниях:

1 л на 1000 л воды в течение 5 дней.

Раствор готовят с учётом суточной потребности в воде.

В период лечения животные должны получать только лекарственную воду.

Воду заменяют свежей каждые 24 часа.

Побочные действия

При применении в рекомендуемых дозах побочные эффекты не выявлены.

Противопоказания

- **Не применять у кур-несушек, яйца которых предназначены в пищу людям.**
 - **Повышенная чувствительность к хинолонам.**
-

Особые указания

Не рекомендуется одновременное применение с хлорамфениколом, макролидами или тетрациклинами из-за возможного антагонистического эффекта.

При работе соблюдать правила личной гигиены и техники безопасности.

Пустую тару запрещено использовать для хранения пищевых продуктов.

Период ожидания

Поросята:

Убой на мясо разрешён через 14 дней после последнего применения.

Птица:

Убой разрешён через 11 дней после последнего применения.

Яйца разрешены к употреблению через 9 дней после последнего применения.

До истечения срока ожидания мясо может использоваться для кормления пушных животных или для производства мясокостной муки.

Условия хранения

Хранить в сухом, защищённом от солнечного света месте при температуре не выше 25°C.

Срок годности: 3 года.

Производитель:

ООО «Биотекс», Грузия.