

## Биококци (Віососс)

### Толтразурил

Раствор для перорального применения

Применяется в ветеринарии

### Целевые виды

Бройлеры, племенная птица, индейки, гуси, утки

### Фармакотерапевтическая группа

Противопротозойное средство

ATC vet code: **QP51BC01** – Toltrazuril

---

### Состав

1 мл содержит: **толтразурил 25 мг.**

Вспомогательные вещества: **полиэтиленгликоль до 1 мл.**

---

### Описание

Бесцветная, прозрачная жидкость с характерным запахом.

---

### Форма выпуска

- 100 мл во флаконе из полиэтилена
  - 1 л во флаконе из полиэтилена
  - 1 мл в стеклянной ампуле
- 

### Фармакологические свойства

Активен в отношении кокцидий (*Eimeria acervulina*, *Eimeria brunetti*, *Eimeria necatrix*, *Eimeria mitis*, *Eimeria adenoides*, *Eimeria meleagridis*, *Eimeria anseris*, *Eimeria truncata*), включая штаммы, устойчивые к другим антикокцидийным препаратам.

Биококци умеренно токсичен для теплокровных животных. При применении в рекомендованных дозах и при увеличении дозы в 10 раз не вызывает у птицы

побочных явлений и осложнений, не препятствует формированию иммунитета против кокцидиоза.

---

### **Показания к применению**

Применяется для профилактики и лечения кокцидиоза у бройлеров, племенной птицы, индеек, гусей и уток.

---

### **Способ применения и дозы**

Биококци применяют с питьевой водой в течение **2 дней** в дозе **7 мг толтразурила на 1 кг массы тела** птицы (**28 мл 2,5% раствора Биококци на 100 кг массы тела**), что эквивалентно:

- **1 мл 2,5% препарата, растворённый в 1 литре питьевой воды**, который дают птице в качестве питья в течение **24 часов**,  
или
- **3 мл препарата на 1 литр питьевой воды** в течение **8 часов, 2 дня подряд**.

При тяжёлом течении заболевания курс лечения повторяют через **5 дней**.

Лечебный раствор Биококци сохраняет активность в течение **48 часов**.

Биококци применяют в комбинации с кормовыми добавками и витаминами. Перед применением препарат необходимо взболтать.

---

### **Побочные действия**

При применении в рекомендованных дозах по показаниям побочных действий не выявлено.

---

### **Противопоказания**

Не применять у кур-несушек.

---

### **Особые указания**

Препарат совместим с кормовыми добавками, витаминами и другими лечебными средствами для птицы.

При работе с Биоккокци необходимо соблюдать правила личной гигиены и технику безопасности при работе с ветеринарными препаратами.

При попадании препарата на кожу или слизистые оболочки — смыть струёй воды.

---

### **Период ожидания**

Убой птицы на мясо допускается **через 8 дней** после последнего применения препарата.

При вынужденном убое ранее указанного срока использование мяса допускается для приготовления мясокостной муки.

**Не применять у кур-несушек!**

---

### **Условия хранения**

Хранить в сухом, защищённом от света месте. Препарат должен храниться плотно закрытым в заводской упаковке при температуре не выше **25°C**.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности: **2 года**.

---

### **Производитель**

ООО **Biotecs**, г. Тбилиси, ул. Юмашева **№8**