

Биомаст (Biomast)

Амоксициллин тригидрат

Лекарственная форма

Масляная суспензия для интрацестерального введения

Применяется в ветеринарии

Состав

1 мл содержит:

Амоксициллин тригидрат – 50 мг

Описание

Масляная суспензия белого или желтоватого цвета с характерным запахом; при отстаивании возможно расслоение.

Фармакотерапевтическая группа

Бета-лактамы антибактериальный препарат

ATC vet code: QJ01CA04

Фармакологические свойства

Активное вещество — амоксициллин тригидрат — является бета-лактамым антибиотиком, производным пенициллина, активным в отношении:

- ***Streptococcus spp.***
- ***Staphylococcus spp.***
- ***Escherichia coli***
- ***Pseudomonas aeruginosa***
- ***Klebsiella spp.***
- ***Candida spp.***

(кроме возбудителя туберкулёза).

Фармакокинетика

После интрацистернального введения активное вещество быстро распределяется по всей молочной железе. Практически не всасывается в системный кровоток, не подвергается биотрансформации и выводится практически в неизменённом виде с молоком.

Показания

Применяется для лечения острых и хронических маститов у крупного и мелкого рогатого скота, вызванных стрептококками, стафилококками, бактериальными палочками, коринебактериями и псевдомонадами (кроме возбудителя туберкулёза).

Противопоказания

При применении в рекомендованных дозах противопоказаний не выявлено.

Побочные действия

При применении в рекомендованных дозах побочные эффекты не отмечены.

Целевые животные

Крупный и мелкий рогатый скот.

Способ применения и дозы

Препарат вводят интрацистернально.

Крупный рогатый скот

10 мл в каждую поражённую четверть вымени, один раз каждые 12–24 часа.

Мелкий рогатый скот

5 мл в каждую поражённую четверть вымени, один раз каждые 12–24 часа.

В сухостойный период

10 мл вводят интрацистернально в каждую поражённую четверть через 10–14 дней после последнего доения.

Период ожидания

Во время лечения молоко из здоровых четвертей можно использовать для кормления животных после кипячения.

Молоко разрешается к употреблению через 2 дня после последнего применения препарата.

Мясо — через 5 дней.

Особые указания

Перед введением сдаивают молоко из всех четырёх четвертей и обрабатывают соски дезинфицирующим раствором.

Катетер или наконечник шприца вводят в сосковый канал и осторожно вводят препарат в поражённую четверть.

После извлечения катетера сосковый канал прижимают на 1–2 минуты. Для равномерного распределения проводят лёгкий массаж соска и вымени.

Не принимать пищу, не пить и не курить при работе с препаратом.

Лицам с гиперчувствительностью избегать контакта.

Взаимодействие

Не применять совместно с бактериостатическими антибиотиками.

Передозировка

При применении согласно инструкции передозировка маловероятна.

Условия хранения

Хранить в сухом прохладном месте, защищённом от света, при температуре 15–25°C.

Срок годности: 2 года.

Утилизация

Не выбрасывать в канализацию или бытовые отходы. Для правильной утилизации обратитесь к ветеринарному врачу.

Форма выпуска

Однодозовый полиэтиленовый шприц 10 мл.

Только для ветеринарного применения.

Отпускается по назначению ветеринарного врача.

Хранить в недоступном для детей месте.

Производитель

ООО Biotecs, Грузия, г. Тбилиси, ул. Юмашева №8