

Биозан-900

Оксиклозанид, Оксфендазол

Лекарственная форма:

Таблетки для перорального применения, для ветеринарного использования

Фармакотерапевтическая группа: Антигельминтное средство

АТС vet код: QP52AC52

Целевые животные: Крупный и мелкий рогатый скот

Состав

1 таблетка содержит:

- Оксиклозанид – 600 мг
- Оксфендазол – 300 мг

Форма выпуска

- №300 таблеток в полиэтиленовом флаконе
- №15 таблеток в блистере
- 6 блистеров в картонной упаковке

Описание

Таблетки сиреневого цвета, возможно с коричневым оттенком и вкраплениями. На одной стороне имеется риска, на другой – надпись «В10».

Фармакологические свойства

Комбинация двух антигельминтных веществ широкого спектра действия обеспечивает полную дегельминтизацию животных.

Оксиклозанид относится к группе салициланилидов. Эффективен против молодых и взрослых форм паразитов. Применяется при фасциолёзе, парамфистомозе, мониезиозе.

Механизм действия основан на нарушении окислительного фосфорилирования и снижении уровня АТФ, что вызывает нарушение метаболизма гельминтов и их гибель.

Медленно всасывается, терапевтическая концентрация достигается через 24 часа. Выводится с фекалиями.

Оксфендазол относится к группе бензимидазолов. Действует на нематод и цестод на всех стадиях развития. Применяется при гемонхозе, остертагиозе, трихостронгилёзе, нематодирозе, коопериозе, эзофагостомозе, буностомозе, диктиокаулёзе, мониезиозе.

Механизм действия связан с блокированием фумаратредуктазы и нарушением энергетического обмена паразита. Выводится с мочой.

Показания

Применяется для лечения крупного и мелкого рогатого скота при:

- Фасциолёзе
 - Парамфистомозе
 - Мониезиозе
 - Диктиокаулёзе
 - Гемонхозе
 - Остертагиозе
 - Трихостронгилёзе
 - Нематодирозе
 - Коопериозе
 - Эзофагостомозе
 - Буностомозе
-

Способ применения и дозы

Применяется перорально, индивидуально.

Фармакологическая доза:

- Оксиклозанид 10–15 мг/кг массы тела
- Оксфендазол 5–7,5 мг/кг массы тела

Практическая доза:

- 1 таблетка на 60 кг массы тела (при фасциолёзе, диктиокаулёзе, гемонхозе, остертагиозе, трихостронгилёзе, нематодирозе, коопериозе, эзофагостомозе, буностомозе)
 - 1 таблетка на 50 кг массы тела (при мониезиозе, парамфистомозе)
-

Противопоказания

Не рекомендуется применять в первом триместре беременности, у ослабленных и больных животных.

Побочные действия

При соблюдении рекомендованных доз не наблюдаются.

Период ожидания

Мясо:

- КРС – 28 суток
- Овцы и козы – 21 сутки

Молоко: допускается к употреблению через 5 суток (10 доек).

Условия хранения

Хранить в сухом, защищённом от света месте при температуре 15–25°C.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности: 3 года.

Производитель: ООО «Биотекс», Грузия