

შემადგენლობა, 1მლ საინექციო ხსნარი შეიცავს:

აქტიურ ნივთიერებებს: D-კლოპროსტენოლის ნატრიუმის მარილს (D-cloprostenole) - 0,075მგ

გამოყენების ჩვენებები

პრეპარატი D-კლოპროსტენოლი გამოიყენება ძროხის, დედაღორის, ფაშატის, მდედრი ბოცვრის, ძუ კატის რეპროდუქციული ფუნქციის გაზრდის, რეგულირებისა და მკურნალობისთვის, მათ შორის:

- სქესობრივი ციკლის ინდუქციისა და სინქრონიზაციისათვის ;
- საკვერცხეების ფუნქციონალური დარღვევების (პერსისტენტული ყვითელი სხეულის, ლუთეინური და ფოლიკულარული კისტის) მკურნალობა;
- საკვერცხეების, მშობიარობის შემდგომი და ანესტრუსის ფუნქციური დარღვევები;
- საშვილოსნოს მშობიარობის შემდგომი დაავადებების (ენდომეტრიტი, პიომეტრა) პროფილაქტიკა და მკურნალობა;
- ნაყოფის პათოლოგიების დროს მაკეობის შეწყვეტა.

გამოყენების წესი და დოზები

*სქესობრივი ციკლის სინქრონიზაცია და ინდუქცია:*

- ძროხების და დეკეულების ფიზიოლოგიური სიმწიფის მიღწევისას პრეპარატი მიიღება - კუნთში 2მლ /ერთ სულზე, ორჯერ 10 დღის ინტერვალით.
- ახურების (მძუვნობის) ნიშნების არ არსებობისას: პრეპარატი ხელახლა მიიღება იგივე დოზით პირველი დოზის მიღებიდან მე-11 დღეს. დადებითი შედეგის მისაღწევად განაყოფიერება უნდა ჩატარდეს პრეპარატის გამოყენების შემდეგ პირველივე ახურებისთანავე. დედაღორი და სარემონტო ნერბი (ახურების ნიშნების გამოვლენის გარეშე) - 0,7 მლ/ცხოველზე ერთჯერადად.
- დედაღორის მოგების ინდუქციისათვის - 0,7-1 მლ/ერთ სულზე ერთჯერადად, ახურებამდე 3 დღით ადრე ან მაკეობის 113-114 დღეზე.
- ფაშატი: 1 მლ ერთჯერადად, მისი მიღება ხდება ახურებიდან 5-13 დღის პერიოდში, ოპტიმალური პერიოდია პრეპარატის მიღებიდან 4-6 დღე.

- მდედრი ბოცვერი: 0,2-0,3 მლ ერთჯერადად, განაყოფიერება 24-48სთ-ში;
- ძუ კატა: 0,2მლ ერთჯერადად, განაყოფიერება 24 სთ-ში

საკვერცხეების ფუნქციონალური დარღვევების მკურნალობა (*ლუთეინური კისტა და პერსისტენტული ყვითელი სხეული*): 2 მლ/ სულზე ერთჯერადად დიაგნოზის დადგენისთანავე.

მშობიარობის შემდგომი სუბინვოლუციური საშვილოსნოს პროფილაქტიკისა და ენდომეტრიტების ექსუდაციური და ქრონიკული ფორმების სამკურნალოდ: ძროხა - მშობიარობიდან 6-12 სთ-ის შემდეგ 2მლ/სულზე,

ერთჯერადად; დედაღორს მომყოლის მოგებიდან 2-4 სთ-ის შემდეგ - 0,7 მლ/სულზე;

ენდომეტრიტის სამკურნალოდ ძროხებს პრეპარატი ეძლევა მაკეობის ყველა სტადიაზე: 2მლ/სულზე. პრეპარატი გამოიყენება სიმპტომატურ თერაპიასთან ერთად. აუცილებლობის შემთხვევაში პრეპარატის მიღებას იმეორებენ იგივე დოზით პირველი შეყვანიდან 10-12 დღის შემდეგ.

*მაკეობის შეწყვეტა ნაყოფის პათოლოგიების გამო (მაკეობის ნებისმიერ სტადიაზე): 2 მლ პრეპარატი/სულზე.*

*მშობიარობის დაწყების ინდუქციისთვის:* კუნთში, 1მლ/ სულზე, ნეზებს - მაკეობის 111 დღიდან.

ლოდინის პერიოდი: სახორცედ დაკვლა დასაშვებია ბოლო ინექციიდან 48 სთ-ის შემდეგ. რძე ადამიანის საკვებად გამოიყენება შეზღუდვების გარეშე.

გამოშვების ფორმა: 2მლ ამპულა და 20მლ მინის ფლაკონი

შენახვის პირობები: ინახება მშრალ, სინათლისაგან დაცულ ადგილას, არაუმეტეს 25°C ტემპერატურაზე. ვადის გასვლის შემდეგ პრეპარატი არ გამოიყენება

ვარგისიანობის ვადა: 2 წელი.

მწარმოებელი: შპს “ბიოტექსი“, საქართველო, თბილისი, იუმანშევის ქ #8