

Состав

1 мл инъекционного раствора содержит:

Действующее вещество: натриевая соль D-клопростенола – 0,075 мг

Показания к применению

Препарат D-Клопан применяется для стимуляции, регулирования и лечения репродуктивной функции у коров, свиноматок, кобыл, самок кроликов и кошек, включая:

- Индукцию и синхронизацию полового цикла
 - Лечение функциональных нарушений яичников (персистирующее жёлтое тело, лютеиновые и фолликулярные кисты)
 - Лечение послеродовых и анэструсных нарушений функции яичников
 - Профилактику и лечение послеродовых заболеваний матки (эндометрит, пиометра)
 - Прерывание беременности при патологиях плода
-

Способ применения и дозы

Синхронизация и индукция полового цикла

- Коровы и тёлки (при физиологической зрелости):
2 мл внутримышечно на одно животное, двукратно с интервалом 10 дней.

При отсутствии признаков охоты — повторное введение в той же дозе на 11-й день после первой инъекции.

Осеменение проводят при первой охоте после применения препарата.

- Свиноматки и ремонтные свинки (без признаков охоты):
0,7 мл однократно.
- Индукция опороса у свиноматок:
0,7–1 мл однократно за 3 дня до предполагаемого опороса или на 113–114-й день супоросности.

- Кобылы:
1 мл однократно, в период 5–13 дней после начала охоты; оптимально — через 4–6 дней.
 - Самки кроликов:
0,2–0,3 мл однократно; осеменение через 24–48 часов.
 - Кошки:
0,2 мл однократно; осеменение через 24 часа.
-

Лечение функциональных нарушений яичников

- Лютеиновые кисты и персистирующее жёлтое тело:
2 мл однократно после постановки диагноза.
-

Послеродовое применение

- Профилактика субинволюции матки и лечение эндометрита:
 - Коровы: 2 мл однократно через 6–12 часов после отёла
 - Свиноматки: 0,7 мл однократно через 2–4 часа после опороса
 - Лечение эндометрита у коров:
2 мл на любом сроке стельности в сочетании с симптоматической терапией.
При необходимости повторить через 10–12 дней.
-

Прерывание беременности

- При патологии плода (на любом сроке беременности):
2 мл однократно.
-

Индукция родов

- Внутримышечно 1 мл;
у свиноматок — с 111-го дня супоросности.

Период ожидания

- Мясо: допускается к убою через 48 часов после последней инъекции.
- Молоко: используется без ограничений.

Форма выпуска

- Ампулы по 2 мл
- Флаконы по 20 мл

Условия хранения

Хранить в сухом, защищённом от света месте при температуре не выше 25°C.
Не применять по истечении срока годности.

Срок годности: 2 года

Производитель: ООО «Биотекси», Грузия, г. Тбилиси, ул. Юмашева №8