

დოქსალინი (Doxalin)

Doxycycline

წამლის ფორმა

ხსნარი პერორალურად მისაღები, გამოიყენება ვეტერინარიაში

ფარმაცოთერაპიული ჯგუფი: სისტემური გამოყენების ანტიბაქტერიულები ATC vet-code: QJ01AA22 - Doxycycline

სამიზნე სახეობა: სასოფლო სამეურნეო ფრინველი, ღორი

შემადგენლობა

1მლ შეიცავს აქტიურ ნივთიერებას: დოქსიციკლინის (ჰიკლატი) 100მგ/მლ

დამხმარე ნივთიერებებს: ნატრიუმის ფორმალდეჰიდის სულფოქსილატს, უწყლო ლიმონმჟავას, არომატიზატორს (პეკუარომა), პროპილენგლიკოლს

გარეგნული აღწერა: ყვითელი, მოყავისფრო ან ყავისფერი ფერის გამჭვირვალე სითხე, დამახასიათებელი სუნით

გამოშვების ფორმა: 100მლ პოლიეთილენის ფლაკონში.

ფარმაცოლოგიური თვისებები

პრეპარატი დოქსალინი ტეტრაციკლინის ჯგუფის ანტიბაქტერიული მოქმედების პრეპარატია. ახასიათებს ბაქტერიოსტატიკური მოქმედება გრამდადებით და გრამუარყოფით მიკროორგანიზმებზე, ზოგიერთ უმარტივესებსა და მიკროპლაზმებზე: *Escherichia coli*, *Haemophilus spp.*, *Pasteurella ssp*, *Salmonella spp.*, *Staphylococcus spp.*, *Streptococcus spp.*, *Clostridium spp.*, *Chlamydia spp.*, *Listeria spp.*, *Leptospira spp.*, *Mycoplasma spp.*

პრეპარატის მოქმედების მექანიზმი დაფუძნებულია იმ ფერმენტების აქტივობის დაბრკოლებაზე, რომლებიც იწვევენ რიბოსომული აქცეპტორების მქონე ამინოაციტილ-რნმ-ს კავშირების კატალიზაციას, რაც იწვევს ამინოაციტილსატრანსპორტო რნმ-ს და მატრიცის რნმ-ის ურთიერთმოქმედების ბლოკირებას და მიკრობულ უჯრედში ცილის სინთეზის დარღვევას.

გამოყენების ჩვენებები

გამოიყენება სასოფლო სამეურნეო ფრინველისა და ღორის ბაქტერიული წარმოშობის რესპირატორული და კუჭ-ნაწლავის დაავადებების დროს, მათ შორის სალმონელოზის, კოლიბაქტერიოზის, ენტერიტის, ენზოოტიური პნევმონიის, პასტერელოზის, მიკოპლაზმოზისა და დოქსიციკლინისადმი მგრძნობიარე მიკროორგანიზმებით გამოწვეული ინფექციების დროს.

გამოყენების წესი და დოზები

პრეპარატი გამოიყენება ფრინველებისა და ღორებისთვის ინდივიდუალურად და ჯგუფურად მკურნალობისთვის, პერორალურად, სასმელ წყალში დამატებით, შემდეგი დოზებით:

ფრინველს: 0,5 - 1მლ/1ლ-ზე, (რაც ექვივალენტია 50-100მგ დოქსიციკლინის 1 ლ სასმელ წყალზე) მკურნალობის კურსი 3-5 დღე.

ღორს: 1 მლ /10კგ ც.წ.-ზე (რაც ექვივალენტია 10 მგ დოქსიციკლინის 1 კგ ც.წ.-ზე), დღეში ერთჯერ, 5 დღის განმავლობაში.

მკურნალობის პერიოდში ცხოველები და ფრინველები მიიღებენ მხოლოდ წყალს პრეპარატის შემცველობით. დოქსალინის სამკურნალო ხსნარი განკუთვნილია 24 სთ-ის განმავლობაში გამოსაყენებლად და შესაბამისად ყოველდღიურად უნდა იყოს

მომზადებული.

უკუჩვენებები

არ შეიძლება პრეპარატის გამოყენება ტეტრაციკლინის მიმართ მგრძნობიარე ცხოველებისთვის. არ გამოიყენება თირკმლის უკმარისობის, მაკეობისა და ლაქტაციის დროს, არ გამოიყენება კვერცხმდებელ ქათმებში.

გვერდითი მოვლენები

დოქსალინის გამოყენებისას ცხოველი უნდა მოარიდოთ მზის სხივებს, რადგან ანტიბიოტიკმა შეიძლება გაზარდოს კანის ფოტომგრძნობელობა. მკურნალობის გაგრძელების შემთხვევაში შეიძლება წარმოიშვას ნაწლავების ალტერაცია.

დაყვნების პერიოდი

ცხოველური პროდუქტების საკვებად გამოიყენება ნებადართულია პრეპარატის ბოლო მიღებიდან, ფრინველის ხორცის - 6 დღის შემდეგ, ღორის ხორცის – 10 დღის შემდეგ.

შენახვის პირობები: ინახება, მშრალ, გრილ სინათლისაგან დაცულ ადგილას 0°C-დან 25°C ტემპერატურამდე.

შეინახეთ ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას.

ვარგისობის ვადა: 3 წელი, შეფუთვის გახსნის შემდეგ 28 დღე.

მწარმოებელი ქვეყანა: შპს “ბიოტეკსი”, საქართველო