

Эктоцидол 600

**Концентрат для приготовления эмульсии для наружного применения
Инсекто-акарицидное средство**

Действующее вещество: Диазинон

Концентрация: 600 мг/мл

Только для ветеринарного применения

Состав

1 мл препарата содержит:

- **Диазинон – 600 мг**
-

Описание

Эктоцидол 600 представляет собой прозрачную жидкость жёлтого или светло-коричневого цвета с характерным специфическим запахом.

Фармакологические свойства

Диазинон относится к химической группе фосфорорганических соединений.

Эктоцидол 600 – инсектоакарицид кишечного и контактного действия.

Препарат активен против:

- **вшей**
- **блох**
- **пухоедов и пероедов**
- **кожных клещей**
- **саркоптоидных и иксодовых клещей**
- **куриного клеща**
- **мух**
- **клопов**

- тараканов
- комаров
- пауков
- других эктопаразитов

Механизм действия

Механизм действия основан на ингибировании холинэстеразы и стимуляции холинергических процессов, что приводит к параличу и гибели паразитов.

По степени воздействия на организм относится к умеренно опасным веществам (III класс опасности).

В рекомендуемых дозах не оказывает местно-раздражающего, кожно-резорбтивного или сенсibiliзирующего действия.

Токсичен для рыб и пчёл.

Показания к применению

Применяется для:

- лечения псороптоза у крупного рогатого скота, овец и коз
 - лечения саркоптоза у свиней
 - лечения наружных энтомозов животных
 - уничтожения клещей, мух и других эктопаразитов
 - дезинсекции и деакаризации помещений для содержания животных и птицы
-

Вид животных

- Крупный рогатый скот
- Мелкий рогатый скот (овцы, козы)
- Свиньи
- Помещения для содержания животных и птицы

Способ применения и дозы

Препарат применяют в виде водной эмульсии.

Рабочий раствор готовят непосредственно перед обработкой.

Разведение для опрыскивания

КРС и свиньи:

10 мл препарата на 24 л тёплой воды.

Купочные ванны

Мелкий рогатый скот (овцы, козы):

Первичная ванна – 10 мл на 24 л воды.

Поддержание концентрации – 10 мл на 8 л воды.

Крупный рогатый скот:

Первичная ванна – 10 мл на 24 л воды.

Поддержание концентрации – 10 мл на 8 л воды.

Обработка помещений

Для обработки пола и стен:

5 л рабочего раствора на 100 м² площади.

Против блох, клещей, тараканов, муравьёв:

20 мл на 1 л воды.

Против насекомых и чесоточных клещей:

10 мл на 10 л воды.

Индивидуальная обработка (опрыскивание)

КРС и мелкий рогатый скот:

1 мл на 1–2,4 л воды.

Свиньи:

1 мл на 2,4 л воды.

Особенности применения

Овцы и козы (псороптоз)

Профилактическое купание – однократно, экспозиция 50–60 секунд.

Овец купают через 15 дней после стрижки.

При необходимости повторяют через 10–15 дней.

КРС (псороптоз, энтомозы)

Опрыскивание водной эмульсией.

При необходимости повтор через 10–14 дней.

Свиньи (саркоптоз)

Профилактика – однократно.

Лечение – двукратно с интервалом 10–14 дней.

Обработку проводят в прохладную или пасмурную погоду при температуре не выше 28°C.

Профилактические обработки – весной и осенью.

Противопоказания

Не применять:

- **больным и ослабленным животным**
 - **животным с повышенной чувствительностью к компонентам препарата**
 - **в последний триместр беременности**
 - **в период лактации**
-

Побочные действия

При соблюдении инструкции побочные эффекты не отмечаются.

При высокой температуре воздуха и солнечном воздействии возможны признаки интоксикации вследствие усиленного всасывания через кожу.

Передозировка

Симптомы, характерные для органофосфатов:

- слюнотечение
- тремор
- возбуждение

При интоксикации:

животное промывают большим количеством воды.

При случайном проглатывании – вызвать рвоту и ввести атропин (1% раствор, 5 мл на 100 кг массы тела).

Взаимодействие

Запрещается смешивание с другими препаратами.

Период ожидания

Мясо – 15 суток после последней обработки.

При вынужденном убое ранее установленного срока мясо используют для кормления плотоядных животных или для производства мясокостной муки.

Молоко – 3 суток после обработки.

Такое молоко может использоваться для кормления животных.

Меры предосторожности

Работы проводить в защитной одежде: халат, перчатки, очки, респиратор.

Во время работы запрещается курить, пить и принимать пищу.

После окончания работы тщательно вымыть руки и лицо с мылом.

При попадании на кожу – промыть большим количеством воды с мылом.

При ухудшении самочувствия – обратиться к врачу.

Препарат огнеопасен.

Не нагревать выше 50°C.

Запрещено использовать пустую тару в бытовых целях.

Условия хранения

Хранить в сухом, защищённом от света месте при температуре не выше 25°C.

Срок годности – 3 года.

Хранить в недоступном для детей месте.

Утилизация

Неиспользованный или просроченный препарат нейтрализуют 5% щелочным раствором или суспензией гашёной/хлорной извести (1:3) и утилизируют в специально отведённых местах вдали от источников воды.

Форма выпуска

- 5 л и 1 л – полиэтиленовые бутылки
 - 100 мл – полиэтиленовый флакон
 - 4 мл – стеклянная ампула
-

Фармакологическая группа

Эктопаразитициды для наружного применения, включая инсектициды

ATC vet code: QP53AF03 – Diazinon

Производитель:

ООО «Biotecs»

Грузия, г. Тбилиси, ул. Юмашева №8