

Ивомектин-F (Ivomectin-F)

Ивермектин + Клорсулон (Clorsulon)

Раствор для инъекций

Только для ветеринарного применения

Описание

Ивомектин-F представляет собой противопаразитарный препарат широкого спектра действия в форме раствора для инъекций, содержащий комбинацию ивермектина и клорсулона. Препарат эффективен против трематод, нематод и различных эктопаразитов. Применяется для лечения и профилактики паразитарных заболеваний крупного рогатого скота, овец и коз.

Состав

1 мл раствора для инъекций содержит:

- Ивермектин – 10 мг
- Клорсулон – 100 мг

Целевые виды животных

Крупный рогатый скот, овцы и козы.

Показания к применению

Препарат применяется при смешанных инвазиях, вызванных трематодами, нематодами и наружными паразитами.

Трематоды

- Печёночные двуустки (*Fasciola hepatica* и *Fasciola gigantica*) – личиночные стадии.

Желудочно-кишечные нематоды

- *Ostertagia* spp.
- *Haemonchus placei*
- *Trichostrongylus* spp.
- *Cooperia* spp.
- *Oesophagostomum radiatum*
- *Nematodirus* spp.
- *Strongyloides papillosus*
- *Chabertia* spp.
- *Bunostomum phlebotomum*

Лёгочные нематоды

- *Dictyocaulus viviparus* (взрослые формы и личинки IV стадии)

Наружные паразиты

- *Hypoderma bovis*
- *Hypoderma lineatum*
- Клещи
- Власоеды
- Возбудители чесотки
- Вши

Способ применения и дозировка

Только для подкожного введения.

Крупный рогатый скот, овцы и козы

- 1 мл на 50 кг массы тела.

Противопоказания

- Не вводить внутривенно или внутримышечно.
- Не применять животным с повышенной чувствительностью к действующим веществам.

Побочные действия

- После подкожного введения возможен временный дискомфорт.
- Возможны лёгкая болезненность или припухлость в месте инъекции.
- В редких случаях возможны реакции гиперчувствительности.

Особые указания

- Вводить только подкожно.
- Для предотвращения местных реакций дозы свыше 10 мл следует распределять на несколько мест инъекции.
- Для достижения максимального эффекта против *Hypoderma lineatum* рекомендуется обработка сразу после окончания сезона лёта оводов.
- Соблюдать осторожность в период миграции личинок гиподермы.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Не применять одновременно с:

- Кетоконазолом
- Итраконазолом
- Циклоспорином
- Блокаторами кальциевых каналов
- Диэтилкарбамазином

Применение при беременности и лактации

Препарат безопасен для применения у беременных и лактирующих животных.

Передозировка

При значительном превышении дозы ивермектина возможны:

- Угнетение
- Апатия
- Атаксия
- Лежачее положение
- Гибель в тяжёлых случаях

Лечение симптоматическое.

Период ожидания

- Мясо: 49 дней.

Молоко: не применять у молочных животных, молоко которых предназначено для употребления человеком, а также за 2 месяца до отёла.

Форма выпуска

100 мл раствора для инъекций во флаконе из бесцветного стекла, герметично закупоренном резиновой пробкой, алюминиевым колпачком и пластиковой крышкой с контролем первого вскрытия. Упакован в картонную коробку.

Условия хранения

- Хранить в сухом, защищённом от света месте.
- Хранить при температуре не выше 30°C.
- Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности: 3 года.

Срок годности после первого вскрытия: 28 дней.

Производитель

ООО Biotecs

Грузия, г. Тбилиси, ул. Иумашеви, №8.