

Мазь цинковая 10 %

(ZINC OINTMENT 10 %)

ZINC OXIDE

Мазь для наружного применения в ветеринарии

Для сельскохозяйственных и домашних животных

Состав

1 г мази содержит:

- **Активное вещество: оксид цинка – 100 мг**
-

Описание

Цинковая мазь представляет собой густую однородную массу белого цвета без запаха.

Фармакологические свойства

Оксид цинка обладает вяжущим, антисептическим, противовоспалительным и защитным действием, оказывает лёгкий противозудный эффект.

Механизм действия связан с образованием альбуминатов и денатурацией белков.

При нанесении на повреждённую поверхность:

- **уменьшается экссудация;**
 - **снижается воспаление и раздражение тканей;**
 - **формируется защитный барьер от раздражающих факторов;**
 - **стимулируются процессы регенерации.**
-

Показания к применению

Применяется при:

- **поверхностных ранах**
 - **ожогах**
 - **язвенных поражениях кожи**
 - **фурункулёзе**
 - **абсцессах**
 - **пиодермии**
 - **дерматитах (поверхностных, аллергических)**
 - **пролежнях**
-

Побочные действия

При применении у животных побочные реакции и осложнения не отмечаются.

Противопоказания

Индивидуальная повышенная чувствительность к оксиду цинка.

Вид животных

Сельскохозяйственные и домашние животные.

Способ применения и дозы

Перед применением поверхность кожи очищают от загрязнений и экссудата.

Мазь наносят тонким слоем на поражённый участок кожи. При необходимости накладывают марлевую повязку.

Обработку проводят 2–3 раза в сутки до выздоровления.

Особые указания

Препарат применяется только наружно.

Избегать попадания в глаза.

Животные могут слизывать мазь — при необходимости следует наложить повязку или использовать защитный воротник.

При появлении аллергической реакции (покраснение, зуд, отёк) мазь удалить и проконсультироваться с ветеринарным врачом.

Длительное применение без ветеринарного контроля не рекомендуется.

Беременность и лактация

При местном применении мазь практически не всасывается системно.

Не обладает тератогенным или эмбриотоксическим действием.

Допускается применение у беременных животных при небольших повреждениях и на ограниченных участках кожи с обязательным контролем.

Если мазь наносится в области сосков (например, при дерматите), перед доением её необходимо тщательно смыть, чтобы остатки цинка не попали в организм новорождённых с молоком.

Передозировка

При наружном применении риск передозировки крайне низкий.

Длительное применение и нанесение толстым слоем может вызвать:

- **сухость кожи;**
 - **чрезмерное вяжущее действие (нарушение нормальной грануляции);**
 - **местное раздражение;**
 - **слабую гиперчувствительность.**
-

Период ожидания

0 дней.

Форма выпуска

20 г мази в полиэтиленовом флаконе.

Условия хранения

Хранить в защищённом от света месте при температуре 10–20°C.

Срок годности

2 года.

Фармакологическая группа

Антисептическое, противовоспалительное средство.

АТСvet код: QD11AX90

Только для ветеринарного применения.

Хранить в недоступном для детей месте.

Производитель

ООО «Biotecs»

Грузия, г. Тбилиси, ул. Юмашева №8