

Неомокс болюс

Лекарственная форма: внутриматочный болюс для ветеринарного применения

Фармакотерапевтическая группа: системное антимикробное, антибактериальное средство

Целевые виды животных: крупный рогатый скот (мясной и молочный), мелкий рогатый скот (овцы, козы), свиньи, лошади

Состав

Каждый болюс массой 4 г содержит:

- Неомицина сульфат — 500 мг
- Окситетрациклина гидрохлорид — 500 мг

Вспомогательные вещества:

Крахмал картофельный 1,2 г, лактоза 1 г, микрокристаллическая целлюлоза 0,36 г, кроскармеллоза натрия 0,2 г, поливинилпирролидон 0,08 г, стеарат магния 0,04 г, тальк 0,12 г.

Описание

Болюс продолговатой формы жёлтого цвета. С одной стороны насечка, с другой — надпись «ВЮ».

Форма выпуска

Продолговатые болюсы №6 в блистере.

5 блистеров в картонной коробке.

Фармакологические свойства

Неомицин — антибиотик группы аминогликозидов широкого спектра действия с бактерицидным эффектом против грамположительных и грамотрицательных бактерий

(*E. coli*, *Salmonella* spp., *Klebsiella* spp., *Proteus* spp., *Shigella*, *Enterobacteriaceae*, *Staphylococcus* spp.).

Окситетрациклин — антибиотик группы тетрациклинов широкого спектра действия, активен в отношении многих грамположительных и грамотрицательных бактерий (*Staphylococcus*, *Streptococcus*, *Micrococcus*, *Bacillus*, *Corynebacterium*, *Campylobacter*), а также простейших (*Trichomonas vaginalis*).

Показания к применению

Применяется для профилактики и лечения послеродовых инфекций половых органов у крупного и мелкого рогатого скота, свиней и лошадей, вызванных микроорганизмами, чувствительными к неомицину и окситетрациклину.

Показан при:

- осложнённых и патологических родах
 - абортах
 - хирургическом удалении последа
 - остром послеродовом эндометрите
-

Способ применения и дозы

Перед применением провести санитарную обработку наружных половых органов. Применять через 2–4 часа после родов.

Профилактика:

КРС, лошади — 1 болюс внутриматочно однократно или двукратно с интервалом 48 часов.

Овцы, козы, свиноматки — $\frac{1}{2}$ болюса внутриматочно однократно или двукратно с интервалом 48 часов.

Лечение:

Коровы, лошади — 1–3 болюса внутриматочно каждые 48 часов до выздоровления.

Овцы, козы, свиноматки — 1–2 болюса внутриматочно каждые 48 часов до выздоровления.

В тяжёлых случаях — каждые 24 часа.

Процедуру повторяют до 3 раз, при необходимости — не более 5 раз.

Побочные действия

Очень редко возможны аллергические реакции (повышение температуры, ангионевротический отёк, зуд, эритема, кожная сыпь).

Противопоказания

Гиперчувствительность к аминогликозидам и антибиотикам группы тетрациклина.

Период ожидания

Убой на мясо разрешён через 6 дней после последнего применения.

Молоко допускается к употреблению через 4 дня после последнего применения.

До истечения указанного срока молоко и мясо могут использоваться только для кормления непродуктивных животных либо подлежат утилизации.

Условия хранения

Хранить в сухом, защищённом от света месте при температуре 10–25°C.

Беречь от детей.

Не хранить вместе с пищевыми продуктами и кормами.

Срок годности

2 года со дня производства.

Производитель:

ООО «Биотекс», Грузия, г. Тбилиси, ул. Юмашева №8

