

Окси-Макс 200 LA (Оху-Мах 200 LA)

Окситетрациклин

Раствор для инъекций

Только для ветеринарного применения

Описание

Окси-Макс 200 LA представляет собой антибактериальный препарат широкого спектра действия на основе окситетрациклина. Эффективен против многих грамположительных и грамотрицательных бактерий, а также микоплазм, хламидий, риккетсий, спирохет и других микроорганизмов, чувствительных к окситетрациклину. Применяется для лечения инфекционных заболеваний крупного рогатого скота, овец, коз и свиней.

Состав

1 мл раствора для инъекций содержит:

- Окситетрациклина дигидрат – 200 мг

Целевые виды животных

Крупный рогатый скот, овцы, козы и свиньи.

Показания к применению

Препарат применяется для лечения инфекций, вызванных микроорганизмами, чувствительными к окситетрациклину, включая:

- Бронхопневмонию
- Колибактериоз
- Сальмонеллёз
- Маститы
- Послеродовые инфекции
- Метриты
- Респираторные инфекции
- Желудочно-кишечные инфекции
- Дерматологические инфекции
- Инфекции мочеполовой системы
- Септицемию
- Вторичные бактериальные инфекции
- Инфицированные раны
- Инфекции копыт
- Другие инфекционные заболевания

Способ применения и дозировка

Внутримышечно.

Крупный рогатый скот, овцы, козы и свиньи

- 0,5–1 мл на 10 кг массы тела
- (10–20 мг окситетрацилина на кг массы тела)
- Однократно
- При необходимости введение можно повторить через 48 часов

Противопоказания

Повышенная чувствительность к тетрацилинам или любому компоненту препарата.

Побочные действия

При применении в рекомендуемых дозах побочные реакции обычно не наблюдаются.

В редких случаях возможны:

- Некроз почечных канальцев
- Гепатотоксичность
- Нарушение формирования костей и зубов у молодых животных
- Азотемия
- Метаболический ацидоз
- Нарушение электролитного баланса

Особые указания

- С осторожностью применять у молодых животных, так как возможно изменение цвета зубов.
- Не вводить в одно место инъекции более:
 - 20 мл крупному рогатому скоту;
 - 10 мл свиньям;
 - 5 мл телятам, овцам и козам.
- Не рекомендуется применять у собак, кошек и лошадей.
- С осторожностью использовать у животных с нарушением функции печени или почек.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

- Не применять одновременно с кортикостероидами.
- Не применять одновременно с эстрогенами.
- Не рекомендуется совместное применение с антибиотиками группы пенициллинов и цефалоспоринов.

Применение при беременности и лактации

Применение окситетрациклина во время беременности и в период формирования зубов у новорождённых животных может привести к изменению окраски зубов.

Передозировка

Окситетрациклин имеет широкий диапазон безопасности, поэтому передозировка маловероятно вызовет токсические реакции.

Период ожидания

- Мясо: 28 дней
- Молоко: 7 дней

Молоко, полученное в период лечения, после термической обработки может использоваться в корм животным.

Форма выпуска

Раствор для инъекций во флаконе из стекла типа II, закупоренном бутиловой резиновой пробкой, алюминиевым колпачком и пластиковой крышкой с контролем первого вскрытия. Упакован в картонную коробку.

Условия хранения

- Хранить в защищённом от света месте.
- Хранить при температуре не выше 30°C.
- Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности: 3 года.

ООО Biotecs

Грузия, г. Тбилиси, ул. Иумашеви, 8.