

## **Окситетрациклина гидрохлорид**

**Водорастворимый порошок**

**Для применения у крупного рогатого скота, овец, коз, поросят и кур**

### **Состав**

**1 г порошка содержит:**

**Окситетрациклина гидрохлорид – 1000 мг**

### **Описание**

**Порошок желтоватого цвета, без запаха, хорошо растворимый в воде.**

### **Фармакологические свойства**

**Окситетрациклина гидрохлорид – антибиотик группы тетрациклинов широкого спектра действия. Активен в отношении многих грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов (*Staphylococcus spp.*, *Streptococcus spp.*, *Pasteurella spp.*, *Escherichia coli*, *Salmonella spp.*), а также некоторых микоплазм, хламидий и спирохет.**

**Не активен в отношении *Proteus spp.*, *Pseudomonas aeruginosa*, большинства грибов и вирусов.**

**В рекомендуемых дозах малотоксичен для теплокровных животных, не оказывает местнораздражающего и сенсibiliзирующего действия.**

### **Фармакокинетика:**

**После перорального применения хорошо всасывается из ЖКТ и быстро распределяется по органам и тканям. Терапевтическая концентрация сохраняется до 12 часов. Выводится с мочой и калом.**

### **Показания к применению**

**Для профилактики и лечения респираторных и желудочно-кишечных заболеваний, а также инфекций мочеполовой системы у КРС, овец, коз, поросят и кур:**

- **Пневмония**
- **Плеврит**
- **Дизентерия**
- **Пастереллез**

- Энтерит
- Инфицированные раны
- Вторичные инфекции при вирусных заболеваниях

Побочные действия

Возможны аллергические реакции.

Противопоказания

- Повышенная чувствительность к окситетрациклину
- Почечная недостаточность
- Вторая половина беременности
- Куры в период яйцекладки

Целевые виды

Крупный рогатый скот, овцы, козы, поросята, куры

Способ применения и дозы

Перед применением растворить в воде или смешать с кормом.

- КРС, овцы, козы:  
10–20 мг/кг массы тела  
Практическая доза: 1–2 г на 100 кг массы тела
- Поросята:  
15–30 мг/кг  
Практическая доза: 1,5–3 г на 100 кг
- Куры:  
20–50 мг/кг  
Практическая доза: 0,5 г на 2,5 л воды

Применять каждые 12 часов в течение 3–6 дней.

Период ожидания

- Мясо – 10 суток
- Молоко – запрещено во время лечения и 2 суток после
- Яйца – запрещено использовать в пищу

**Фармакотерапевтическая группа: Системное антибактериальное средство,  
антибиотик**

**АТСvet код: QJ01AA06**

**Хранить в сухом, защищенном от света месте при 15–30°C.**

**Срок годности: 4 года.**

**Хранить в недоступном для детей месте.**

**Только для ветеринарного применения.**

**Отпускается по назначению ветеринарного врача.**

**Производитель: ООО «Биотекс», ул. Иумашеви №8, Тбилиси, Грузия.**