

პენსტრეპტო (Penstrepto)

Penicillin G Procaine + Dihydrostreptomycin Sulphate

საინექციო სუსპენზია
მხოლოდ ვეტერინარული გამოყენებისთვის

აღწერა

პენსტრეპტო (Penstrepto) წარმოადგენს ფართო სპექტრის ანტიბაქტერიულ საინექციო სუსპენზიას, რომელიც შეიცავს პენიცილინ G პროკაინსა და დიჰიდროსტრეპტომიცინის სულფატს. ამ ორი ანტიბიოტიკის კომბინაცია უზრუნველყოფს ეფექტურ მოქმედებას როგორც გრამდადებითი, ისე გრამუარყოფითი ბაქტერიების წინააღმდეგ და გამოიყენება სხვადასხვა ბაქტერიული ინფექციის სამკურნალოდ მსხვილფეხა რქოსან პირუტყვში, ცხენებში, ღორებში, ცხვრებსა და თხებში.

შემადგენლობა

1 მლ საინექციო სუსპენზია შეიცავს:

- პენიცილინ G პროკაინი – 200 000 სე
- დიჰიდროსტრეპტომიცინის სულფატი – 200 მგ

სამიზნე სახეობა:

მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვი, ცხენი, ღორი, ცხვარი, თხა.

გამოყენების ჩვენებები

პრეპარატი გამოიყენება პენიცილინისა და დიჰიდროსტრეპტომიცინის მიმართ მგრძობიარე მიკროორგანიზმებით გამოწვეული ინფექციების სამკურნალოდ.

მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვი:

- პიომეტრა;
- მასტიტი;
- აქტინომიკოზი;
- ლეპტოსპიროზი;
- მეტრიტი;
- დიარეა;
- ცისტიტი;

- სეფსისი;
- ჰემორაგიული სეპტიცემია;
- ხბოს პნევმონია.

ღორები:

- ფილტვების დაავადებები;
- ბრუცელოზი;
- ქოლერა.

ცხენები:

- სეფსისური ინფექციები;
- პნევმონია;
- ტუბერკულოზი;
- სხვა ბაქტერიული ინფექციები.

ცხვარი და თხა:

- საყრდენ-მამოძრავებელი სისტემის ინფექციები;
- სასუნთქი სისტემის ბაქტერიული დაავადებები;
- შარდსასქესო სისტემის ბაქტერიული ინფექციები.

გამოყენების წესი და დოზირება

გამოყენებამდე კარგად შეანჯღრით.

ინტრამუსკულარულად.

მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვი, ცხენი, ღორი, ცხვარი და თხა:

- 1 მლ / 25 კგ სხეულის მასაზე;
- დღეში ერთხელ;
- ზედიზედ 3 დღის განმავლობაში.

უკუჩვენებები

- მომატებული მგრძნობელობა პენიცილინის, დიჰიდროსტრეპტომიცინის ან პრეპარატის სხვა კომპონენტების მიმართ;
- არ გამოიყენოთ მაკეობის ბოლო ტრიმესტრში, რადგან შესაძლებელია ნაადრევი მშობიარობის ან ნაყოფის დაკარგვის რისკი.

გვერდითი მოვლენები

- ალერგიული რეაქციები;
- კუნთში ან კანქვეშ შეყვანისას ტკივილი და ადგილობრივი გაღიზიანება;
- ქსოვილოვანი რეაქციები ინექციის ადგილზე.

განსაკუთრებული მითითებები

- პრეპარატის მაქსიმალური მოცულობა ერთ ინექციის ადგილზე არ უნდა აღემატებოდეს:
 - მსხვილფეხა პირუტყვი და ცხენი – 20 მლ;
 - ღორი – 10 მლ;
 - ცხვარი, თხა და ხბო – 5 მლ.
- სიფრთხილით გამოიყენეთ თირკმლის დაავადების ან თირკმლის ფუნქციის დარღვევის მქონე ცხოველებში.
- არ გადააჭარბოთ რეკომენდებულ დოზას ან მკურნალობის ხანგრძლივობას.
- ალერგიული რეაქციის ან ანაფილაქსიური შოკის შემთხვევაში გამოიყენება ადრენალინი, გლუკოკორტიკოიდები და ანტიჰისტამინური საშუალებები.

ურთიერთქმედება სხვა პრეპარატებთან

არ არის რეკომენდებული ერთდროული გამოყენება:

- მაკროლიდებთან;
- ტეტრაციკლინებთან;
- ქლორამფენიკოლთან;
- თეოფილინთან;
- სხვა ანტიბიოტიკებთან.

მაკეობა და ლაქტაცია

პრეპარატი შეიძლება გამოყენებულ იქნეს მაკე და მემუძურ ცხოველებში.

თუმცა მაკე ღორებსა და სანაშენე დედაღორებში აღწერილია ვულვიდან გამონადენის შემთხვევები, რაც შესაძლოა დაკავშირებული იყოს აბორტის რისკთან.

ლოდინის პერიოდი

მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვი, ცხვარი, თხა და ღორი:

- ხორცი – 18 დღე;
- რძე – 3 დღე.

გამოშვების ფორმა

100 მლ საინექციო სუსპენზია მოთავსებულია უფერო მინის ფლაკონში, რომელიც მჭიდროდ დახურულია რეზინის საცობით, ალუმინის ჩაჩითა და პლასტმასის მოსაძრობი თავსახურით პირველი გახსნის კონტროლისთვის. შეფუთულია მუყაოს კოლოფში.

შენახვის პირობები

- შეინახეთ ორიგინალ, მჭიდროდ დახურულ შეფუთვაში;
- მშრალ, ბნელ და გრილ ადგილას;
- არაუმეტეს 30°C ტემპერატურაზე;
- შეინახეთ ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას.

ვარგისიანობის ვადა: 3 წელი.

მწარმოებელი: შ.პ.ს ბიოტექსი