

Пенстрепто (Penstrepto)

Прокаин бензилпенициллин + Дигидрострептомицина сульфат

Суспензия для инъекций

Только для ветеринарного применения

Описание

Пенстрепто представляет собой антибактериальную инъекционную суспензию широкого спектра действия, содержащую прокаин бензилпенициллин и дигидрострептомицина сульфат. Комбинация этих двух антибиотиков обеспечивает эффективное действие против грамположительных и грамотрицательных бактерий и применяется для лечения различных бактериальных инфекций у крупного рогатого скота, лошадей, свиней, овец и коз.

Состав

1 мл суспензии для инъекций содержит:

- Прокаин бензилпенициллин – 200 000 МЕ
- Дигидрострептомицина сульфат – 200 мг

Целевые виды животных

Крупный рогатый скот, лошади, свиньи, овцы и козы.

Показания к применению

Препарат применяется для лечения инфекционных заболеваний, вызванных микроорганизмами, чувствительными к пенициллину и дигидрострептомицину.

Крупный рогатый скот

- Пиометра
- Мастит
- Актиномикоз
- Лептоспироз
- Метрит
- Диарея
- Цистит
- Сепсис
- Геморрагическая септицемия
- Пневмония телят

Свиньи

- Заболевания лёгких
- Бруцеллёз
- Холера свиней

Лошади

- Септические инфекции
- Пневмония
- Туберкулёз
- Другие бактериальные инфекции

Овцы и козы

- Инфекции опорно-двигательного аппарата
- Бактериальные заболевания дыхательной системы
- Бактериальные инфекции мочеполовой системы

Способ применения и дозировка

Перед применением тщательно встряхнуть.

Вводить внутримышечно.

Крупный рогатый скот, лошади, свиньи, овцы и козы

- 1 мл на 25 кг массы тела
- Один раз в сутки
- В течение 3 последовательных дней

Противопоказания

- Повышенная чувствительность к пенициллину, дигидрострептомицину или другим компонентам препарата.
- Не применять в последнем триместре беременности, так как возможно преждевременное родоразрешение или потеря плода.

Побочные действия

- Аллергические реакции
- Боль и местное раздражение в месте инъекции
- Тканевые реакции после внутримышечного или подкожного введения

Особые указания

Максимальный объём препарата в одно место инъекции не должен превышать:

- Крупный рогатый скот и лошади — 20 мл
- Свиньи — 10 мл
- Овцы, козы и телята — 5 мл

С осторожностью применять у животных с заболеваниями почек или нарушением функции почек.

Не превышать рекомендуемую дозу и продолжительность лечения.

При аллергических реакциях или анафилактическом шоке применяют адреналин, глюкокортикостероиды и антигистаминные препараты.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Не рекомендуется одновременное применение с:

- Макролидами
- Тетрациклинами
- Хлорамфениколом
- Теофиллином
- Другими антибиотиками

Применение при беременности и лактации

Препарат может применяться у беременных и лактирующих животных.

Однако у супоросных и племенных свиноматок отмечались выделения из вульвы, которые могут быть связаны с риском аборта.

Период ожидания

Крупный рогатый скот, овцы, козы и свиньи

- Мясо: 18 дней
- Молоко: 3 дня

Форма выпуска

100 мл суспензии для инъекций во флаконе из бесцветного стекла, герметично закрытом резиновой пробкой, алюминиевым колпачком и пластиковой крышкой с контролем первого вскрытия. Упакован в картонную коробку.

Условия хранения

- Хранить в оригинальной плотно закрытой упаковке.
- Хранить в сухом, тёмном и прохладном месте.

- Хранить при температуре не выше 30°C.
- Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности: 3 года.

Производитель

ООО Biotecs

Грузия, г. Тбилиси, ул. Иумашеви, №8.