

სულტრიმი პერორალურად მისაღები ტაბლეტი, გამოიყენება ვეტერინარიაში.

ფარმაკოთერაპიული ჯგუფი: სისტემური გამოყენების ანტიმიკრობული, ანტიბაქტერიული საშუალება.

სამიზნე სახეობა: მსხვილფეხა და წვრილფეხა პირუტყვი, ხორცისმჭამელი ცხოველები, ფრინველი.

შემადგენლობა: 1 ტაბლეტი შეიცავს: სულფადიმიდინ ნატრიუმს 400 მგ; ტრიმეტროპრიმს 80 მგ;

გამოყენების ჩვენებები:

სულტრიმის ტაბლეტები გამოიყენება ყველა სახის შინაური ცხოველების ინფექციური დაავადებების სამკურნალოდ, რომელთა გამომწვევია სულფამეტოქსაზოლისა და ტრიმეტროპრიმისადმი მგრძობიარე მიკროორგანიზმები.

- ზედა და ქვედა სასუნთქი გზების ინფექციები;
- საჭმლის მომნელებელი ტრაქტის დაავადება;
- შარდსასქესო ორგანოების ინფექციები;
- ვირუსული დაავადებების დროს მეორადი ინფექციები;
- კანის და რბილი ქსოვილების ინფექციები;
- რბილი ქსოვილების ინფექციები.

მსხვილფეხა და წვრილფეხა პირუტყვი, ხორცისმჭამელი ცხოველები: დიარეა, კოლისეპტიცემია, სტრეპტოკოკებით გამოწვეული პოლიართრიტი, სალმონელოზი, პასტერელოზი, პნევმონია, სტაფილოკოკებით გამოწვეული აბსცესი.

ღორი: კოლიბაქტერიოზი, ატროფიული რინიტი, სალმონელოზი, პასტერელოზი, ტოქსოპლაზმოზი, ჰემოფილოზური პლევროპნევმონია, წითელი ქარი.

ფრინველი: კოქციდიოზი, პასტერელოზი, კოლისეპტიცემია, სალმონელოზი, სტაფილოკოკოზი, ინფექციური სურდო.

ბოცვერი: კოქციდიოზი, სალმონელოზი, სტაფილოკოკოზი.

გამომშვების ფორმა: 90 ტაბლეტი, პოლიეთილენის ფლაკონში.

გამოყენების წესი და დოზები:

*მსხვილფეხა და წვრილფეხა პირუტყვი, ხორცისმჭამელები, ღორი და ბოცვერი -*

პრეპარატი ეძლევა საკვებთან, წყალში ან რძეში შერეული შემდეგი დოზირებით - 1 ტაბლეტი (480 მგ) 15კგ ც.წ, 12 სთ-ის ინტერვალით 3-5 დღის განმავლობაში.

*ფრინველი* - 1 კვირამდე ასაკის წიწილებს – 1/4 ტაბლეტი (120 მგ) გახსნილი 2 ლ სასმელ წყალში.

*მეხორცული და მეკვერცხული მიმართულების მოზარდ ქათმებს* - (1-8 კვირის ასაკის) – 1/2 ტაბლეტი (240 მგ) – 2 ლ წყალში ან 1 კგ საკვებში შერეული.

*კვერცხმდებელი ქათმები* (20 კვირაზე მეტი ასაკის) – 1/2 ტაბლეტი (240 მგ) გახსნილი 1ლ სასმელ წყალში ან 3/4 ტაბლეტი (360მგ) 1კგ საკვებში შერეული.

*ინდაური* (5-20 კვირის ასაკის)— 1/2 ტაბლეტი (240 მგ) 1ლ წყალთან ერთად.

პრეპარატის წყალთან მიცემისას პრეპარატის საჭირო რაოდენობას წინასწარ ხსნიან მცირე რაოდენობის წყალში (100-150 მლ) ერთგვაროვანი სუსპენზიის მიღებამდე. მიღებულ სუსპენზიას უმატებენ სრულ გახსნამდე.

ყველა სახის ცხოველის მკურნალობას აწარმოებენ დაავადების კლინიკური ნიშნების გაქრობამდე 2 მომდევნო დღის განმავლობაში.

შენახვის პირობები: პრეპარატი ინახება მშრალ, სინათლისაგან დაცულ ადგილას არაუმეტეს 20°C ტემპერატურაზე.

ვარგისიანობის ვადა: 3 წელი.

მწარმოებელი: ბიოტექსი, საქართველო.