

Тилотекс (Tyloteks)

Лекарственная форма: раствор для инъекций

Фармакотерапевтическая группа: антибактериальное средство системного действия, антибиотик

АТС vet code: QJ01FA90 (tylosin)

Виды животных: крупный рогатый скот, овцы, козы, свиньи, собаки, кошки, птица

Состав

1 мл раствора содержит:

Тилозина тартрат – 100 мг

Описание

Прозрачная жидкость желтого цвета со специфическим запахом.

Форма выпуска

Флаконы темного стекла по 10, 20, 50 и 100 мл, герметично закрытые резиновой пробкой, алюминиевой обкаткой и пластиковой крышкой контроля первого вскрытия.

Фармакологические свойства

Тилозина тартрат – антибиотик группы макролидов с широким бактериостатическим спектром действия. Активен в отношении грамположительных и некоторых грамотрицательных микроорганизмов: *Escherichia coli*, *Bacillus anthracis*, *Pasteurella* spp., *Haemophilus* spp., *Leptospira* spp., *Staphylococcus* spp., *Streptococcus* spp., *Erysipelothrix* spp., *Corynebacterium* spp., *Mycoplasma* spp., *Chlamydia* spp., *Treponema* spp. (*Brachispira*).

Механизм действия основан на подавлении синтеза белка в бактериальной клетке путем связывания с 50S субъединицей рибосомы.

После внутримышечного введения быстро всасывается, максимальная концентрация достигается через 1 час. Терапевтический уровень сохраняется 20–24 часа. Выводится с мочой и желчью, у лактирующих животных – с молоком.

Относится к малоопасным веществам (4 класс опасности).

Показания

КРС: болезни дыхательных путей, дифтерия, мастит, метрит, вторичные осложнения вирусных инфекций.

Овцы, козы: инфекционная агалактия, пневмония коз.

Свиньи: энзоотическая пневмония, микоплазменный артрит, рожа свиней, дизентерия, гастроэнтерит.

Собаки, кошки: бактериальные инфекции ЖКТ, дыхательной и мочеполовой системы.

Птица: респираторный микоплазмоз, инфекционный синусит индюков, хронические респираторные инфекции, инфекционный ринит, спирохетоз, некротический энтерит.

Побочные действия

При соблюдении доз не выявлены.

Редко у свиней возможны аллергические реакции, которые проходят после отмены препарата.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к тилозину.

Не применять у лошадей.

Не применять совместно с тиамулином, клиндамицином, левомицетином, пенициллином, цефалоспоринами, линкомицином.

Способ применения и дозы

Внутримышечно 1 раз в сутки, курс 3–5 дней.

- КРС, овцы, козы – 1 мл на 10–20 кг массы
- Свиньи – 1 мл на 10–50 кг
- Собаки, кошки – 1 мл на 10–20 кг
- Птица – 0,1 мл на 1 кг

Не более 5 мл в одно место у свиней и 10 мл у КРС.

Период ожидания

Мясо:

- КРС, овцы, козы, свиньи – 8 дней
- Птица – 3 дня

Яйцо: 0 дней

Молоко: 4 дня

Условия хранения

Хранить в сухом, прохладном, защищенном от света месте при температуре не выше 20°C.

Беречь от детей.

Только для ветеринарного применения.

Срок годности – 2 года.

Производитель: ООО «Биотекс», Грузия, Тбилиси, ул. Юмашева №8.