

## Уротропин

Международное непатентованное наименование: Метенамин (Methenamine)

Производитель: ООО «Biotecs», Грузия

Действующее вещество: Гексаметилентетрамин

Лекарственная форма: Порошок для перорального применения в ветеринарии.

Фармакотерапевтическая группа: Системное противомикробное, антибактериальное средство.

Целевой вид: Крупный и мелкий рогатый скот, лошади, свиньи, собаки, птица.

---

## Состав и форма выпуска

1 г порошка содержит:

- Гексаметилентетрамин – 1000 мг

Препарат расфасован по 250 г в серебристые полиэтиленовые пакеты.

---

## Условия хранения

Хранить в сухом, тёмном, защищённом от солнечных лучей месте при температуре от 5°C до 25°C.

Срок годности: 2 года.

---

## Фармакологические свойства

Уротропин — синтетический лекарственный препарат с выраженным мочегонным эффектом. Он повышает проницаемость клеточных мембран, ускоряя выведение токсинов из организма.

Механизм действия основан на расщеплении гексаметилентетрамина с высвобождением активного формальдегида и аммиака. Этот процесс происходит только в кислой среде почек и мочевыводящих путей, где препарат проявляет антибактериальное действие.

Препарат воздействует на возбудителей заболеваний, инфекции мочевыводящих путей и воспалительные очаги с высоким содержанием кислых продуктов распада тканей.

Гексаметилентетрамин и его метаболиты выводятся из организма с мочой.

Относится к мало токсичным веществам (4 класс опасности).

---

### Показания к применению

Применяется у крупного и мелкого рогатого скота, лошадей, свиней, собак и птицы как антисептическое средство при:

- Инфекциях мочевыводящих путей (цистит, пиелит)
  - Холецистите
  - Менингите
  - Энцефалите
  - Аллергических заболеваниях кожи (крапивница, полиморфная эритема)
  - Заболеваниях глаз (иридоциклит, кератит)
  - Отравлениях и токсикоинфекциях
  - Мочекислом диатезе (подагре)
  - Воспалении суставов и мышц
- 

### Способ применения и дозировка

Применяют перорально в течение 3–5 дней:

- Крупный рогатый скот, лошади – 5–20 г
  - Мелкий рогатый скот, свиньи – 2–5 г
  - Собаки – 0,5–2 г
  - Птица – 0,01–0,05 г
-

## Период ожидания

Убой животных на мясо разрешается через 1 день после последнего применения препарата.

При вынужденном убое до истечения срока мясо используют для кормления пушных зверей после термической обработки или для производства мясо-костной муки.

Молоко допускается к употреблению человеком через 1 день после последнего применения препарата.

Молоко, полученное в период лечения, после термической обработки используют для кормления животных.

---

## Меры личной профилактики

При работе с препаратом Уротропин соблюдать общие правила личной гигиены и безопасности, установленные для работы с лекарственными средствами.

После окончания работы вымыть руки тёплой водой с мылом.

При случайном попадании на кожу или в глаза тщательно промыть водой.

При появлении аллергической реакции или случайном проглатывании препарата обратиться в медицинское учреждение (иметь при себе инструкцию и этикетку).

Хранить в недоступном для детей месте.