

ВетоКет (VetoKet)

Раствор для инъекций
Только для ветеринарного применения

Описание

ВетоКет представляет собой нестероидный противовоспалительный препарат для инъекций, содержащий кетопрофен. Обладает противовоспалительным, обезболивающим и жаропонижающим действием. Применяется для лечения различных воспалительных и болевых состояний у крупного рогатого скота, свиней и лошадей.

Состав

1 мл содержит:

- Кетопрофен – 100 мг

Целевые виды животных

Крупный рогатый скот, свиньи, лошади.

Показания к применению

Крупный рогатый скот

- Снижение боли и воспаления при заболеваниях опорно-двигательного аппарата;
- Лечение воспалительных заболеваний вымени.

Свиньи

- Послеродовой синдром дисгалактии (метрит, мастит, агалактия);
- Заболевания дыхательной системы в качестве противовоспалительного и жаропонижающего средства.

Лошади

- Заболевания опорно-двигательного аппарата и суставов;
- Симптоматическое лечение болей при коликах;
- Уменьшение послеоперационной боли и отёка.

Способ применения и дозировка

Крупный рогатый скот

Внутримышечно или внутривенно:

- 3 мг кетопрофена/кг массы тела в сутки;
- Эквивалентно 3 мл препарата на 100 кг массы тела в сутки;
- В течение 3 дней.

Свиньи

Внутримышечно:

- 3 мг кетопрофена/кг массы тела;
- Эквивалентно 3 мл препарата на 100 кг массы тела;
- Однократно.

Лошади

Внутривенно:

- 2,2 мг кетопрофена/кг массы тела в сутки;
- Эквивалентно 1 мл препарата на 45 кг массы тела в сутки;
- В течение 3–5 дней.

Важно: При коликах повторное лечение не следует проводить до клинического обследования животного. Не рекомендуется вводить более 5 мл препарата в одно место внутримышечной инъекции.

Противопоказания

- Повышенная чувствительность к кетопрофену;
- Язвенные и другие поражения желудочно-кишечного тракта;
- Геморрагический диатез;
- Дискразии крови;
- Нарушения функции печени, сердца или почек;
- Жеребята в первый месяц жизни.

Побочные действия

- Местное раздражение после повторных внутримышечных инъекций;
- Раздражение или язвообразование желудочно-кишечного тракта;
- Временное снижение аппетита у свиней;
- Аллергические реакции.

Применение при беременности и лактации

Влияние кетопрофена на фертильность, беременность и жизнеспособность плода у лошадей не установлено. Препарат не следует применять у жеребых кобыл и жеребят младше 15 дней.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

- Не применять одновременно с диуретиками;
- Не применять одновременно с антикоагулянтами;
- Не применять одновременно с другими нестероидными противовоспалительными средствами или в течение 24 часов после их применения.

Передозировка

Возможные симптомы:

- Снижение аппетита;
- Рвота;
- Диарея.

Период ожидания

Крупный рогатый скот, свиньи, лошади

- Мясо и субпродукты: 4 дня;
- Молоко (коровы): 0 дней.

Форма выпуска

100 мл раствора для инъекций во флаконе из тёмного стекла, укупоренном резиновой пробкой, алюминиевым колпачком и пластиковой крышкой с контролем первого вскрытия. Упакован в картонную коробку.

Условия хранения

- Хранить в плотно закрытой упаковке;
- Хранить в сухом, защищённом от света месте;
- Хранить при температуре не выше 25°C;
- Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности: 3 года.

Производитель

ООО Biotecs

Грузия, г. Тбилиси, ул. Иумашеви, №8.