

Йодоформный порошок

Порошок для наружного применения

Для всех видов животных

Состав

1 г порошка содержит активные вещества:

- **Йодоформ – 0,011 г**
 - **Борная кислота – 0,149 г**
 - **Окситетрациклин гидрохлорид – 0,04 г**
 - **Стрептоцид – 0,05 г**
-

Описание

Порошок от светло-жёлтого до жёлтого цвета со специфическим характерным запахом.

Фармакологические свойства

Антисептическое действие препарата обусловлено свойствами входящих в его состав активных веществ.

Йодоформ — при контакте с поверхностью раны высвобождает активный йод и постепенно разлагается, обеспечивая длительный антибактериальный эффект.

Борная кислота — антисептическое средство с инсектицидным действием. Способствует коагуляции белков, в том числе ферментативных, нарушает проницаемость клеточных мембран, подавляет фагоцитоз, тормозит рост и развитие бактерий.

Окситетрациклин гидрохлорид — антибиотик широкого спектра действия из группы тетрациклинов, обладает выраженным бактериостатическим эффектом, активен в отношении многих грамположительных и грамотрицательных бактерий, риккетсий, спирохет, крупных вирусов и некоторых простейших.

Стрептоцид — сульфаниламид короткого действия с бактериостатическим эффектом. Эффективен против стрептококков, менингококков, гонококков, кишечной палочки и других микроорганизмов. Антагонизируя с парааминобензойной кислотой, блокирует синтез фолиевой кислоты в микробной клетке, подавляя рост и развитие микроорганизмов.

Показания к применению

Применяется при:

- **инфицированных ранах;**
 - **послеоперационных ранах;**
 - **язвах;**
 - **кожных высыпаниях;**
 - **мокнущей экземе;**
 - **дерматитах;**
 - **тендовагинитах;**
 - **флегмонах;**
 - **лимфаденитах;**
 - **трудно заживающих ранах.**
-

Побочные действия

При применении согласно инструкции побочные реакции и осложнения (аллергические реакции кожи, местное раздражение) не отмечаются.

Противопоказания

Не установлены.

Вид животных

Животные.

Способ применения и дозы

Препарат применяют местно путём распыления на поражённый участок.

Перед применением очищают повреждённый участок от загрязнений и удаляют некротические ткани.

Порошок наносят тонким слоем 1–2 раза в сутки.

Не допускать слизывания препарата животным.

Необходимость повторной обработки зависит от хирургических показаний и степени тяжести поражения.

Взаимодействие с другими препаратами

Информация о взаимодействии отсутствует.

Передозировка

Данные о передозировке отсутствуют.

Беременность и лактация

Наружное применение йодоформного порошка во время беременности и лактации не ограничено.

Период ожидания

Мясо и молоко — 0 дней.

Особые указания

Для целевых животных

При появлении атипичных симптомов после начала лечения необходимо обратиться к ветеринарному врачу.

Для персонала

При работе соблюдать правила личной гигиены и технику безопасности.

Во время работы запрещается пить, курить и принимать пищу.

После окончания работы руки необходимо вымыть тёплой водой с мылом.

Лицам с повышенной чувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта.

При случайном попадании на кожу или слизистые оболочки промыть большим количеством воды.

При развитии аллергической реакции или случайном проглатывании немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию или этикетку).

Условия хранения

Хранить в сухом, защищённом от света месте при температуре не выше 25°C.

Срок годности

2 года.

Форма выпуска

50 г порошка для наружного применения в полиэтиленовом флаконе.

Фармакотерапевтическая группа

Антибиотик, дерматологическое лечебное средство.

ATCvet code: QD06AA53 — Oxytetracycline, combinations.

**Только для ветеринарного применения.
Отпускается по назначению ветеринарного врача.
Хранить в недоступном для детей месте.**

Производитель

**ООО «Biotecs»
Грузия, г. Тбилиси
ул. Iumashev №8**